武夷山国家公园

鸟类图鉴

A PHOTOGRAPHIC GUIDE TO THE BIRDS OF WUYISHAN NATIONAL PARK

万勇 主编

海峡出版发行集团 | 海峡书局

图书在版编目（CIP）数据

武夷山国家公园鸟类图鉴 / 万勇主编．—福州：海峡书局，2021.6
ISBN 978-7-5567-0839-0

Ⅰ．①武… Ⅱ．①万… Ⅲ．①武夷山—国家公园—鸟类—图集 Ⅳ．①Q959.708-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2021）第 111277 号

主　　编：万　勇
责任编辑：廖飞琴　魏　芳　陈　婧　卢佳颖　陈洁蕾
责任校对：杨自龙　张　莹
装帧设计：林晓莉　李　晔　黄舒堉　董玲芝

WǓYÍSHĀN GUÓJIĀ GŌNGYUÁN NIǍOLÈI TÚJIÀN
武夷山国家公园鸟类图鉴

出版发行：海峡书局
地　　址：福州市台江区白马中路 15 号
邮　　编：350001
印　　刷：雅昌文化（集团）有限公司
开　　本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印　　张：25
图　　文：400 码
版　　次：2021 年 6 月第 1 版
印　　次：2021 年 6 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5567-0839-0
定　　价：360 元

版权所有，翻印必究
如有印装质量，请与我社联系。

武夷山国家公园管理局 福建省武夷山生物研究所

《武夷山国家公园鸟类图鉴》编委会

总策划：林雅秋

策　划：林贵民 杨佑生

主　编：万　勇

副主编：张惠光 罗夏琦

编　委：詹丽英 朱建琴 张　勇 肖博琨 刘　刚

序

武夷山是一座神奇的名山，位于江西、福建两省的交界，主峰黄岗山海拔 2160.8 米，为中国大陆东南部最高峰。我曾多次到这里考察，绿水青山、百鸟争鸣，给我留下了深刻的印象。

武夷山地处中亚热带季风气候区，保存了世界上同纬度带保存最完整、最典型、面积最大的中亚热带原生性森林生态系统。特殊的地理位置和良好的生态环境，使其成为许多珍稀动植物的“天然避难所”。

据不完全统计，武夷山国家公园共记录有高等植物 2799 种，野生脊椎动物 558 种，并已整理鉴定出昆虫 6849 种。其中尤以鸟类、两栖动物、爬行动物以及昆虫种类众多而闻名，因此素有“鸟类天堂”“蛇的王国”“昆虫世界”以及“研究亚洲两栖爬行动物的钥匙”等美誉。

武夷山是我国动植物模式标本的重要产地。早在 19 世纪，英、法、美等国学者就进入武夷山采集标本。迄今已采集的动植物模式标本 1000 多种，其中包括黄腹角雉、崇安髭蟾等中国特有物种。作为描述新物种的科学依据，这些模式标本现在大多保存在伦敦等地的博物馆内。

为保护武夷山的自然环境和生物多样性，1979 年 4 月，福建省人民政府建立了武夷山自然保护区。武夷山自然保护区在国内外得到了高度重视，1987 年 9 月被联合国教科文组织列为世界人与生物圈保护网络成员，1992 年 12 月被世界野生生物基金会（WWF）评为具有全球保护意义的 A 级自然保护区，1998 年 2 月被国家 14 部委列为我国陆地生物多样性保护的 11 个关键地区之一，1999 年 12 月被列入《世界文化与自然遗产名录》，2006 年 12 月被国家林业局确定为全国示范自然保护区。党的十八届三中全会提出建立国家公园体制，武夷山被纳入我国首批十家国家公园体制试点，2016 年 6 月，国家发改委批复《武夷山国家公园体制试点区试点实施方案》；2020 年 9 月，武夷山国家公园高质量通过了国家林业和草原局组织的专家验收；2021 年 3 月 22 日，习近平总书记到福建考察调研，首站莅临武夷山国家公园。考察期间，习近平总书记谆谆告诫：“武夷山有着无与伦比的生态人文资源，是中华民族的骄傲，最重要的还是要保护好”，并强调要坚持生态保护第一。

生态文明建设，最终目标是人与自然和谐相处，重要指标是生物多样性和生态系统的稳定性。摸清物种种类和资源分布现状，可为开展生物多样性保护提供科学依据。武夷山国家公园素有“鸟类天堂”之称，依据多年来的考察成果，武夷山国家公园管理局编撰《武夷山国家公园鸟类图鉴》一书，共收录鸟类 21 目 77 科 390 种，是目前记载武夷山国家公园鸟类物种最多的一本图鉴。书中每种鸟类不仅有中文名、拉丁学名和英文名，还配有多幅精彩图片，充分展现了武夷山国家公园的鸟类风采和武夷山国家公园的生态魅力。

《武夷山国家公园鸟类图鉴》的出版，对加强武夷山国家公园的生态保护、科学研究、科普宣传以及国家公园建设和管理等方面，将发挥十分积极的作用。我相信，该书的出版也将进一步促进福建省观鸟爱鸟活动的开展。我期待，在该书的带动下，武夷山国家公园更多精美的生态图鉴将陆续问世。是以为序。

中国动物学会副理事长
北京师范大学教授

目录

如何使用本书 / 001
武夷山国家公园概况及鸟类情况 / 002

雁形目 ANSERIFORMES
鸭科 Anatidae
豆雁 *Anser fabalis* / 006
短嘴豆雁 *Anser serrirostris* / 007
白额雁 *Anser albifrons* / 008
小天鹅 *Cygnus columbianus* / 009
鸳鸯 *Aix galericulata* / 012
棉凫 *Nettapus coromandelianus* / 014
花脸鸭 *Sibirionetta formosa* / 015
赤膀鸭 *Mareca strepera* / 015
白眉鸭 *Spatula querquedula* / 016
琵嘴鸭 *Spatula clypeata* / 017
罗纹鸭 *Mareca falcata* / 018
赤颈鸭 *Mareca penelope* / 019
斑嘴鸭 *Anas zonorhyncha* / 020
绿头鸭 *Anas platyrhynchos* / 021
针尾鸭 *Anas acuta* / 022
绿翅鸭 *Anas crecca* / 023
凤头潜鸭 *Aythya fuligula* / 024
斑背潜鸭 *Aythya marila* / 026
红胸秋沙鸭 *Mergus serrator* / 027
普通秋沙鸭 *Mergus merganser* / 028
中华秋沙鸭 *Mergus squamatus* / 030

鸡形目 GALLIFORMES
雉科 Phasianidae
中华鹧鸪 *Francolinus pintadeanus* / 032
鹌鹑 *Coturnix japonica* / 032
蓝胸鹑 *Excalfactoria chinensis* / 033
白眉山鹧鸪 *Arborophila gingica* / 034
灰胸竹鸡 *Bambusicola thoracicus* / 035
勺鸡 *Pucrasia macrolopha* / 036
白鹇 *Lophura nycthemera* / 037
黄腹角雉 *Tragopan caboti* / 038
雉鸡 *Phasianus colchicus* / 040
白颈长尾雉 *Syrmaticus ellioti* / 042

鹱形目 PROCELLARIIFORMES
海燕科 Hydrobatidae
黑叉尾海燕 *Oceanodroma monorhis* / 044

䴙䴘目 PODICIPEDIFORMES
䴙䴘科 Podicipedidae
凤头䴙䴘 *Podiceps cristatus* / 045
小䴙䴘 *Tachybaptus ruficollis* / 046

鹳形目 CICONIIFORMES
鹳科 Ciconiidae
黑鹳 *Ciconia nigra* / 048

鹈形目 PELECANIFORMES
鹮科 Threskiornithidae
白琵鹭 *Platalea leucorodia* / 050

鹭科 Ardeidae
黄苇鳽 *Ixobrychus sinensis* / 052
栗苇鳽 *Ixobrychus cinnamomeus* / 053

黑鳽 *Ixobrychus flavicollis* / 054
海南鳽 *Gorsachius magnificus* / 055
夜鹭 *Nycticorax nycticorax* / 056
绿鹭 *Butorides striata* / 058
池鹭 *Ardeola bacchus* / 060
牛背鹭 *Bubulcus coromandus* / 064
苍鹭 *Ardea cinerea* / 066
草鹭 *Ardea purpurea* / 068
中白鹭 *Ardea intermedia* / 069
大白鹭 *Ardea alba* / 070
白鹭 *Egretta garzetta* / 072

鲣鸟目
SULIFORMES

军舰鸟科 Fregatidae
白斑军舰鸟 *Fregata ariel* / 074

鸬鹚科 Phalacrocoracidae
普通鸬鹚 *Phalacrocorax carbo* / 075

鹰形目
ACCIPITRIFORMES

鹗科 Pandionidae
鹗 *Pandion haliaetus* / 078

鹰科 Accipitridae
黑翅鸢 *Elanus caeruleus* / 080
凤头蜂鹰 *Pernis ptilorhynchus* / 081
黑冠鹃隼 *Aviceda leuphotes* / 082
蛇雕 *Spilornis cheela* / 083
鹰雕 *Nisaetus nipalensis* / 084
乌雕 *Clanga clanga* / 085
林雕 *Ictinaetus malaiensis* / 086
草原雕 *Aquila nipalensis* / 087
白腹隼雕 *Aquila fasciata* / 087
凤头鹰 *Accipiter trivirgatus* / 088
赤腹鹰 *Accipiter soloensis* / 089
日本松雀鹰 *Accipiter gularis* / 090
松雀鹰 *Accipiter virgatus* / 091
雀鹰 *Accipiter nisus* / 092
苍鹰 *Accipiter gentilis* / 093
白尾鹞 *Circus cyaneus* / 094
鹊鹞 *Circus melanoleucos* / 095
黑鸢 *Milvus migrans* / 096
灰脸鵟鹰 *Butastur indicus* / 097
普通鵟 *Buteo japonicus* / 098

鹤形目
GRUIFORMES

秧鸡科 Rallidae
普通秧鸡 *Rallus indicus* / 100
蓝胸秧鸡 *Lewinia striatia* / 101
黑水鸡 *Gallinula chloropus* / 102
骨顶鸡 *Fulica atra* / 103
红脚苦恶鸟 *Zapornia akool* / 104
小田鸡 *Zapornia pusilla* / 105
红胸田鸡 *Zapornia fusca* / 106
董鸡 *Gallicrex cinerea* / 107
白胸苦恶鸟 *Amaurornis phoenicurus* / 108

鹤科 Gruidae
灰鹤 *Grus grus* / 109

鸻形目
CHARADRIIFORMES

三趾鹑科 Turnicidae
黄脚三趾鹑 *Turnix tanki* / 110
棕三趾鹑 *Turnix suscitator* / 110

反嘴鹬科 Recurvirostridae
黑翅长脚鹬 *Himantopus himantopus* / 111
反嘴鹬 *Recurvirostra avosetta* / 112

鸻科 Charadriidae
凤头麦鸡 *Vanellus vanellus* / 114
灰头麦鸡 *Vanellus cinereus* / 116
金斑鸻 *Pluvialis fulva* / 117
灰斑鸻 *Pluvialis squatarola* / 118
长嘴剑鸻 *Charadrius placidus* / 119
金眶鸻 *Charadrius dubius* / 120
环颈鸻 *Charadrius alexandrinus* / 121

彩鹬科 Rostratulidae
彩鹬 *Rostratula benghalensis* / 122

水雉科 Jacanidae
水雉 *Hydrophasianus chirurgus* / 124

丘鹬科 Scolopacidae
中杓鹬 *Numenius phaeopus* / 126
白腰杓鹬 *Numenius arquata* / 127
黑尾塍鹬 *Limosa limosa* / 128
流苏鹬 *Calidris pugnax* / 129
尖尾滨鹬 *Calidris acuminata* / 130
弯嘴滨鹬 *Calidris ferruginea* / 131
青脚滨鹬 *Calidris temminckii* / 132
长趾滨鹬 *Calidris subminuta* / 133
红颈滨鹬 *Calidris ruficollis* / 134
黑腹滨鹬 *Calidris alpina* / 135
半蹼鹬 *Limnodromus semipalmatus* / 136
丘鹬 *Scolopax rusticola* / 137
针尾沙锥 *Gallinago stenura* / 138
扇尾沙锥 *Gallinago gallinago* / 138
大沙锥 *Gallinago megala* / 139
红颈瓣蹼鹬 *Phalaropus lobatus* / 140
矶鹬 *Actitis hypoleucos* / 141
白腰草鹬 *Tringa ochropus* / 142
灰尾漂鹬 *Tringa brevipes* / 144
红脚鹬 *Tringa totanus* / 145
泽鹬 *Tringa stagnatilis* / 146
林鹬 *Tringa glareola* / 147
青脚鹬 *Tringa nebularia* / 148
鹤鹬 *Tringa erythropus* / 148

燕鸻科 Glareolidae
普通燕鸻 *Glareola maldivarum* / 149

鸥科 Laridae
红嘴鸥 *Chroicocephalus ridibundus* / 150
黑尾鸥 *Larus crassirostris* / 154
鸥嘴噪鸥 *Gelochelidon nilotica* / 155

普通燕鸥 *Sterna hirundo* / 155
白额燕鸥 *Sternula albifrons* / 156
须浮鸥 *Chlidonias hybrida* / 157
白翅浮鸥 *Chlidonias leucopterus* / 158

鸽形目
COLUMBIFORMES

鸠鸽科 Columbidae
山斑鸠 *Streptopelia orientalis* / 159
火斑鸠 *Streptopelia tranquebarica* / 160
珠颈斑鸠 *Spilopelia chinensis* / 161
斑尾鹃鸠 *Macropygia unchall* / 162
红翅绿鸠 *Treron sieboldii* / 162

鹃形目
CUCULIFORMES

杜鹃科 Cuculidae
褐翅鸦鹃 *Centropus sinensis* / 163
小鸦鹃 *Centropus bengalensis* / 163
红翅凤头鹃 *Clamator coromandus* / 164
噪鹃 *Eudynamys scolopaceus* / 165
八声杜鹃 *Cacomantis merulinus* / 166
乌鹃 *Surniculus lugubris* / 167
鹰鹃 *Hierococcyx sparverioides* / 167
小杜鹃 *Cuculus poliocephalus* / 168
四声杜鹃 *Cuculus micropterus* / 168
中杜鹃 *Cuculus saturatus* / 169
大杜鹃 *Cuculus canorus* / 169

鸮形目
STRIGIFORMES

仓鸮科 Tytonidae
草鸮 *Tyto longimembris* / 170

鸱鸮科 Strigidae
领角鸮 *Otus lettia* / 171
黄嘴角鸮 *Otus spilocephalus* / 172
红角鸮 *Otus sunia* / 172
雕鸮 *Bubo bubo* / 173
褐林鸮 *Strix leptogrammica* / 174
北鹰鸮 *Ninox japonica* / 174
领鸺鹠 *Glaucidium brodiei* / 175
斑头鸺鹠 *Glaucidium cuculoides* / 176
长耳鸮 *Asio otus* / 177
短耳鸮 *Asio flammeus* / 177

夜鹰目
CAPRIMULGIFORMES

夜鹰科 Caprimulgidae
普通夜鹰 *Caprimulgus jotaka* / 178

雨燕目
APODIFORMES

雨燕科 Apodidae
白喉针尾雨燕 *Hirundapus caudacutus* / 179
白腰雨燕 *Apus pacificus* / 179
小白腰雨燕 *Apus nipalensis* / 180

咬鹃目
TROGONIFORMES

咬鹃科 Trogonidae
红头咬鹃 *Harpactes erythrocephalus* / 181

佛法僧目
CORACIIFORMES

佛法僧科 Coraciidae
三宝鸟 *Eurystomus orientalis* / 182

翠鸟科 Alcedinidae
白胸翡翠 *Halcyon smyrnensis* / 183
蓝翡翠 *Halcyon pileata* / 184
普通翠鸟 *Alcedo atthis* / 185
斑头大翠鸟 *Alcedo hercules* / 186
冠鱼狗 *Megaceryle lugubris* / 187
斑鱼狗 *Ceryle rudis* / 188

蜂虎科 Meropidae
蓝喉蜂虎 *Merops viridis* / 189

犀鸟目
BUCEROTIFORMES

戴胜科 Upupidae
戴胜 *Upupa epops* / 192

䴕形目
PICIFORMES

拟啄木鸟科 Megalaimidae
大拟啄木鸟 *Psilopogon virens* / 193
黑眉拟啄木鸟 *Psilopogon faber* / 194

啄木鸟科 Picidae
蚁䴕 *Jynx torquilla* / 195
斑姬啄木鸟 *Picumnus innominatus* / 196
星头啄木鸟 *Yungipicus canicapillus* / 196
大斑啄木鸟 *Dendrocopos major* / 197
白背啄木鸟 *Dendrocopos leucotos* / 198
大黄冠啄木鸟 *Chrysophlegma flavinucha* / 199
黄冠啄木鸟 *Picus chlorolophus* / 200
竹啄木鸟 *Gecinulus grantia* / 200
灰头绿啄木鸟 *Picus canus* / 201
黄嘴栗啄木鸟 *Blythipicus pyrrhotis* / 202
栗啄木鸟 *Micropternus brachyurus* / 203

隼形目
FALCONIFORMES

隼科 Falconidae
白腿小隼 *Microhierax melanoleucos* / 204
红隼 *Falco tinnunculus* / 205
燕隼 *Falco subbuteo* / 206
游隼 *Falco peregrinus* / 207
红脚隼 *Falco amurensis* / 208

雀形目
PASSERIFORMES

钩嘴鹎科 Vangidae
钩嘴林鹎 *Tephrodornis virgatus* / 210

燕鹎科 Artamidae
灰燕鹎 *Artamus fuscus* / 211

鹃鹎科 Campephagidae
灰山椒鸟 *Pericrocotus divaricatus* / 211
灰喉山椒鸟 *Pericrocotus solaris* / 212
赤红山椒鸟 *Pericrocotus speciosus* / 213
小灰山椒鸟 *Pericrocotus cantonensis* / 214
大鹃鹎 *Coracina macei* / 215
暗灰鹃鹎 *Lalage melaschistos* / 216

伯劳科 Laniidae
虎纹伯劳 *Lanius tigrinus* / 216
牛头伯劳 *Lanius bucephalus* / 218
棕背伯劳 *Lanius schach* / 218
红尾伯劳 *Lanius cristatus* / 220
楔尾伯劳 *Lanius sphenocercus* / 221

莺雀科　Vireonidae
白腹凤鹛 *Erpornis zantholeuca* / 221
红翅鹎鹛 *Pteruthius aeralatus* / 222
淡绿鹎鹛 *Pteruthius xanthochlorus* / 223

黄鹂科　Oriolidae
黑枕黄鹂 *Oriolus chinensis* / 224

卷尾科　Dicruridae
发冠卷尾 *Dicrurus hottentottus* / 225
灰卷尾 *Dicrurus leucophaeus* / 226
黑卷尾 *Dicrurus macrocercus* / 227

王鹟科　Monarchidae
寿带 *Terpsiphone incei* / 228

鸦科　Corvidae
松鸦 *Garrulus glandarius* / 229
红嘴蓝鹊 *Urocissa erythroryncha* / 230
灰树鹊 *Dendrocitta formosae* / 232
喜鹊 *Pica serica* / 232
白颈鸦 *Corvus torquatus* / 233
大嘴乌鸦 *Corvus macrorhynchos* / 233

仙莺科　Stenostiridae
方尾鹟 *Culicicapa ceylonensis* / 234

山雀科　Paridae
黄眉林雀 *Sylviparus modestus* / 235
冕雀 *Melanochlora sultanea* / 235
煤山雀 *Periparus ater* / 236
远东山雀 *Parus minor* / 236
黄腹山雀 *Pardaliparus venustulus* / 237
黄颊山雀 *Machlolophus spilonotus* / 238

攀雀科　Remizidae
中华攀雀 *Remiz consobrinus* / 239

百灵科　Alaudidae
小云雀 *Alauda gulgula* / 240

鹎科　Pycnonotidae
栗背短脚鹎 *Hemixos castanonotus* / 240
绿翅短脚鹎 *Ixos mcclellandii* / 241
黑短脚鹎 *Hypsipetes leucocephalus* / 242
白喉红臀鹎 *Pycnonotus aurigaster* / 243
白头鹎 *Pycnonotus sinensis* / 244
领雀嘴鹎 *Spizixos semitorques* / 246

燕科　Hirundinidae
淡色沙燕 *Riparia diluta* / 248
家燕 *Hirundo rustica* / 250
烟腹毛脚燕 *Delichon dasypus* / 252
金腰燕 *Cecropis daurica* / 253

鳞胸鹪鹛科　Pnoepygidae
小鳞胸鹪鹛 *Pnoepyga pusilla* / 254

树莺科　Cettiidae
棕脸鹟莺 *Abroscopus albogularis* / 255
远东树莺 *Horornis canturians* / 255
强脚树莺 *Horornis fortipes* / 256
黄腹树莺 *Horornis acanthizoides* / 256
鳞头树莺 *Urosphena squameiceps* / 257

长尾山雀科　Aegithalidae
红头长尾山雀 *Aegithalos concinnus* / 257

柳莺科　Phylloscopidae
黄眉柳莺 *Phylloscopus inornatus* / 258
黄腰柳莺 *Phylloscopus proregulus* / 258
巨嘴柳莺 *Phylloscopus schwarzi* / 259
褐柳莺 *Phylloscopus fuscatus* / 259
棕腹柳莺 *Phylloscopus subaffinis* / 260
冕柳莺 *Phylloscopus coronatus* / 260
白眶鹟莺 *Phylloscopus intermedius* / 261
灰冠鹟莺 *Phylloscopus tephrocephalus* / 261
比氏鹟莺 *Phylloscopus valentini* / 262
淡尾鹟莺 *Phylloscopus soror* / 262
双斑绿柳莺 *Phylloscopus plumbeitarsus* / 263
淡脚柳莺 *Phylloscopus tenellipes* / 263
极北柳莺 *Phylloscopus borealis* / 264
栗头鹟莺 *Phylloscopus castaniceps* / 264
黑眉柳莺 *Phylloscopus ricketti* / 265
冠纹柳莺 *Phylloscopus claudiae* / 266
华南冠纹柳莺 *Phylloscopus goodsoni* / 267
白斑尾柳莺 *Phylloscopus ogilviegranti* / 267

苇莺科　Acrocephalidae
东方大苇莺 *Acrocephalus orientalis* / 268
黑眉苇莺 *Acrocephalus bistrigiceps* / 268
钝翅苇莺 *Acrocephalus concinens* / 269
厚嘴苇莺 *Arundinax aedon* / 269

蝗莺科　Locustellidae
小蝗莺 *Helopsaltes certhiola* / 270
棕褐短翅莺 *Locustella luteoventris* / 270
高山短翅莺 *Locustella mandelli* / 271

扇尾莺科　Cisticolidae
棕扇尾莺 *Cisticola juncidis* / 271
山鹪莺 *Prinia striata* / 272
黑喉山鹪莺 *Prinia superciliaris* / 272
黄腹山鹪莺 *Prinia flaviventris* / 273
纯色山鹪莺 *Prinia inornata* / 273
长尾缝叶莺 *Orthotomus sutorius* / 274

鹛科　Timaliidae
红头穗鹛 *Cyanoderma ruficeps* / 274
棕颈钩嘴鹛 *Pomatorhinus ruficollis* / 275
华南斑胸钩嘴鹛 *Erythrogenys swinhoei* / 275

幽鹛科　Pellorneidae
褐顶雀鹛 *Schoeniparus brunneus* / 276

雀鹛科　Alcippeidae
淡眉雀鹛 *Alcippe hueti* / 276

噪鹛科　Leiothrichidae
赤尾噪鹛 *Trochalopteron milnei* / 277
红嘴相思鸟 *Leiothrix lutea* / 277
画眉 *Garrulax canorus* / 278
小黑领噪鹛 *Garrulax monileger* / 278
灰翅噪鹛 *Ianthocincla cineracea* / 279
白颊噪鹛 *Pterorhinus sannio* / 279
黑脸噪鹛 *Pterorhinus perspicillatus* / 280
黑领噪鹛 *Pterorhinus pectoralis* / 280
棕噪鹛 *Pterorhinus berthemyi* / 281

鸦雀科　Paradoxornithidae
褐头雀鹛 *Fulvetta manipurensis* / 281
棕头鸦雀 *Sinosuthora webbiana* / 282
金色鸦雀 *Suthora verreauxi* / 282
短尾鸦雀 *Neosuthora davidiana* / 283
灰头鸦雀 *Psittiparus gularis* / 283

绣眼鸟科　Zosteropidae
栗颈凤鹛 *Staphida torqueola* / 284
黑颏凤鹛 *Yuhina nigrimenta* / 285
暗绿绣眼鸟 *Zosterops simplex* / 286

丽星鹩鹛科　Elachuridae
丽星鹩鹛 *Elachura formosa* / 287

鸭科　Sittidae
普通鸭 *Sitta europaea* / 288
栗臀鸭 *Sitta nagaensis* / 289

椋鸟科　Sturnidae
八哥 *Acridotheres cristatellus* / 290
灰椋鸟 *Spodiopsar cineraceus* / 292
丝光椋鸟 *Spodiopsar sericeus* / 293
黑领椋鸟 *Gracupica nigricollis* / 296
北椋鸟 *Agropsar sturninus* / 296
灰背椋鸟 *Sturnia sinensis* / 297
紫翅椋鸟 *Sturnus vulgaris* / 297

鸫科　Turdidae
橙头地鸫 *Geokichla citrina* / 298
白眉地鸫 *Geokichla sibirica* / 299
怀氏虎鸫 *Zoothera aurea* / 300
灰背鸫 *Turdus hortulorum* / 301
乌灰鸫 *Turdus cardis* / 302
灰翅鸫 *Turdus boulboul* / 303
乌鸫 *Turdus mandarinus* / 304
红尾鸫 *Turdus naumanni* / 304
白眉鸫 *Turdus obscurus* / 305
白腹鸫 *Turdus pallidus* / 306
斑鸫 *Turdus eunomus* / 307

鹟科　Muscicapidae
鹊鸲 *Copsychus saularis* / 307
灰纹鹟 *Muscicapa griseisticta* / 308
乌鹟 *Muscicapa sibirica* / 308
北灰鹟 *Muscicapa dauurica* / 309
褐胸鹟 *Muscicapa muttui* / 309
棕尾褐鹟 *Muscicapa ferruginea* / 310
白喉林鹟 *Cyornis brunneatus* / 310
海南蓝仙鹟 *Cyornis hainanus* / 311
棕腹大仙鹟 *Niltava davidi* / 312
棕腹仙鹟 *Niltava sundara* / 313
小仙鹟 *Niltava macgrigoriae* / 314
白腹蓝鹟 *Cyanoptila cyanomelana* / 315
铜蓝鹟 *Eumyias thalassinus* / 315
白喉短翅鸫 *Brachypteryx leucophris* / 316
中华短翅鸫 *Brachypteryx sinensis* / 316
红尾歌鸲 *Larvivora sibilans* / 317
日本歌鸲 *Larvivora akahige* / 317
蓝喉歌鸲 *Luscinia svecica* / 318
红喉歌鸲 *Calliope calliope* / 318
红胁蓝尾鸲 *Tarsiger cyanurus* / 319
小燕尾 *Enicurus scouleri* / 319
灰背燕尾 *Enicurus schistaceus* / 320
白冠燕尾 *Enicurus leschenaulti* / 320
斑背燕尾 *Enicurus maculatus* / 321
紫啸鸫 *Myophonus caeruleus* / 322
白眉姬鹟 *Ficedula zanthopygia* / 323
黄眉姬鹟 *Ficedula narcissina* / 324
鸲姬鹟 *Ficedula mugimaki* / 326
红喉姬鹟 *Ficedula albicilla* / 328
北红尾鸲 *Phoenicurus auroreus* / 329
红尾水鸲 *Phoenicurus fuliginosus* / 330
白顶溪鸲 *Phoenicurus leucocephalus* / 331
蓝矶鸫 *Monticola solitarius* / 332
栗腹矶鸫 *Monticola rufiventris* / 334
灰林鹏 *Saxicola ferreus* / 335
东亚石鹏 *Saxicola stejnegeri* / 336

河乌科　Cinclidae
褐河乌 *Cinclus pallasii* / 337

叶鹎科　Chloropseidae
橙腹叶鹎 *Chloropsis hardwickii* / 338

啄花鸟科　Dicaeidae
红胸啄花鸟 *Dicaeum ignipectus* / 340

太阳鸟科　Nectariniidae
叉尾太阳鸟 *Aethopyga christinae* / 341

雀科　Passeridae
山麻雀 *Passer cinnamomeus* / 342
麻雀 *Passer montanus* / 343

梅花雀科　Estrildidae
斑文鸟 *Lonchura punctulata* / 344
白腰文鸟 *Lonchura striata* / 345

鹡鸰科　Motacillidae
山鹡鸰 *Dendronanthus indicus* / 346
黄鹡鸰 *Motacilla tschutschensis* / 346
白鹡鸰 *Motacilla alba* / 348
黄头鹡鸰 *Motacilla citreola* / 350
灰鹡鸰 *Motacilla cinerea* / 350
理氏鹨 *Anthus richardi* / 351
田鹨 *Anthus rufulus* / 351
树鹨 *Anthus hodgsoni* / 352
黄腹鹨 *Anthus rubescens* / 352
北鹨 *Anthus gustavi* / 353
红喉鹨 *Anthus cervinus* / 354
粉红胸鹨 *Anthus roseatus* / 355
水鹨 *Anthus spinoletta* / 356

燕雀科　Fringillidae
燕雀 *Fringilla montifringilla* / 357
黑尾蜡嘴雀 *Eophona migratoria* / 358
黑头蜡嘴雀 *Eophona personata* / 360
金翅雀 *Chloris sinica* / 360
普通朱雀 *Carpodacus erythrinus* / 362
褐灰雀 *Pyrrhula nipalensis* / 363
黄雀 *Spinus spinus* / 364

鹀科　Emberizidae
凤头鹀 *Emberiza lathami* / 365
蓝鹀 *Emberiza siemsseni* / 366
三道眉草鹀 *Emberiza cioides* / 367
白眉鹀 *Emberiza tristrami* / 368
栗耳鹀 *Emberiza fucata* / 369
小鹀 *Emberiza pusilla* / 370
黑头鹀 *Emberiza melanocephala* / 370
黄眉鹀 *Emberiza chrysophrys* / 371
田鹀 *Emberiza rustica* / 372
黄喉鹀 *Emberiza elegans* / 373
黄胸鹀 *Emberiza aureola* / 374
栗鹀 *Emberiza rutila* / 375
灰头鹀 *Emberiza spodocephala* / 376

后记 / 378
参考文献 / 379
中文笔画索引 / 380
拉丁文索引 / 383

如何使用本书



缩写名词表

世界自然保护联盟濒危物种红色名录（2018）：

LC：无危 LC　NT：近危 NT　VU：易危 VU　EN：濒危 EN　CR：极危 CR　NR：未认可 NR

留：留鸟；旅：旅鸟；夏：夏候鸟；冬：冬候鸟；迷：迷鸟

罕见：低于 5 次记录；少见：遇见率低于 20%；易见：遇见率 20% ～ 50%；常见：遇见率高于 50%

武夷山国家公园概况及鸟类情况

2016 年 6 月，国家发改委批复《武夷山国家公园体制试点区试点实施方案》，武夷山国家公园成为中国首批 10 个国家公园体制试点之一，规划总面积 1001.41 平方千米，分为核心保护区（面积 505.76 平方千米）和一般控制区（面积 495.65 平方千米）两个管控分区，包含了世界文化与自然遗产地、国家级自然保护区、国家级风景名胜区、国家级森林公园、国家级水产种质资源保护区等 5 种保护地类型。是全国唯一一个既加入世界人与生物圈组织，又是世界文化与自然遗产地的国家公园。

一、地理位置

武夷山国家公园位于福建省北部，北与江西省交界，南至建阳区黄坑镇，西至光泽县崇仁乡，东至武夷山市武夷街道，规划总面积 1001.41 平方千米。地理坐标为东经 117° 24' 13" ～ 117° 59'19"，北纬 27° 31' 20" ～ 27° 55' 49"。

二、自然环境条件

（一）地质地貌

武夷山地区主要分布了前震旦系和震旦系的变质岩系，中生代的火山岩、花岗岩和碎屑岩。该地区经历了漫长的地质演变过程，在中生代晚期，发生了强烈的火山喷发活动，继而又有大规模的花岗岩侵入，为典型的亚洲东部环太平洋带的构造特征。其后，武夷山地区发育了一套河湖相沉积，产有丰富的动植物化石，成为研究我国东部侏罗系、白垩系地层及时代划分的典型剖面。白垩纪晚期的红色砂砾岩是形成丹霞地貌的主体。

中生代的地壳运动奠定了武夷山地貌的基本骨架。第四纪以来，武夷山西部的黄岗山上升了 1000 米，而东部崇安—武夷宫盆地上升幅度缓慢，使武夷山地区在 30 千米的范围内高度相差近 2000 米，平均坡降 6.5%，发育了从中山到丘陵盆地的系列地貌类型和从西到东的 2100 ～ 2200 米、1800 ～ 1900 米、1100 ～ 1200 米、700 ～ 800 米、500 ～ 550 米和 400 米左右等六级夷平面。武夷山国家公园中北部的黄岗山海拔 2160.8 米，是国家公园最高处，也是我国大陆东南第一峰，素有“华东屋脊”之称，海拔 1800 米以上的山峰有 34 座；国家公园最低处位于东南部的崇阳溪，海拔仅 176.1 米。

受地质构造的严格控制，武夷山国家公园西部发育了长达几十公里岩壁陡峭的深大断裂谷和断块山脊，如黄岗山—大竹岚的断层深谷，NW 和 EW 向断裂谷与 NNE、NW 断裂构成了典型的格子状构造地貌。东部地区因受 NNE、NW 和 EW 断裂构造的控制，发育了曲折多弯的溪流和柱状、锥状、悬崖等丹霞地貌，形成山水相融的九曲溪风光。EW 和 SN 向断裂构造产生了风景似画的章堂涧、倒水坑至牛栏坑、九龙窠和流香涧的“王”字形断裂谷系。岩性对武夷山地貌发育也很明显，西部海拔 1500 米以上的山峰基本上由坚硬的凝灰熔岩和流纹岩等构成，东部红色砂页岩地区则往往发育有较宽的谷地和盆地。

（二）气候

武夷山国家公园属中亚热带季风气候型，西北部的高大山体构成了一道天然屏障，冬季阻拦、削弱了北方冷空气的入侵，夏季抬升、截留了东南海洋季风，形成了武夷山地区中亚热带温暖湿润的季风气候，具有气候垂直变化显著、温暖湿润、四季分明、降水丰富等特点。

武夷山国家公园总体年均气温 17℃～ 19℃，最高气温为 7 月份，月平均气温在 28℃～ 29℃之间，极端高温 41.4℃；最低气温为 1 月份，月平均气温 6℃～ 9℃，极端低温 -9℃；年均总积温 6633℃；年均降水量 1684 ～ 1780 毫米，牯主峰黄岗山年均降水量高达 3400 余毫米。雨季分明，3 ～ 4 月份为春雨季，约占全年降水量的 23%～ 24%；5 ～ 6 月份为梅雨季节，约占全年降水量的 36%～ 37%；7 ～ 9 月份为雷雨季节，约占全年降水量的 20%；10 月至翌年 2 月为秋冬少雨季节，两季仅占全年降水量的 20%。全年降雨日数一般在 150 天以上，最长达 199 天。武夷山国家公园植被茂密，雨量充沛，年均相对湿度为 78%，一年内各月平均相对湿度有较明显的变化，其中 3 ～ 6 月份一般都在 80%以上，以 6 月最高，达到 83%，10 月和 1 月最低，约在 75%。多年平均陆地面蒸发量约为 720 毫米，水面蒸发量为 1000 毫米左右。

（三）水文

武夷山脉是闽、赣两省的天然界线，是闽江、长江水系的分水岭，在福建一侧为闽江和汀江水系的主要发源地。山脉北段水系主要河流有闽江及其干支流建溪、富屯溪、沙溪，三大主干支流共有集雨面积在 50 平方千米以上的支流 176 条，形成树枝状分布、径流量大、流域面积广的自然水系。

武夷山国家公园位于闽江流域上游主要支流——建溪水系的上游区域，国家公园区域的主要河流有桐木溪、黄柏溪、麻阳溪、崇阳溪、清溪河等，呈树枝状，属山地河流，其中桐木溪、黄柏溪、麻阳溪及崇阳溪上游的主要支流均发源于国家公园西部，形成了丰富的天然河流湿地资源。

（四）土壤

武夷山国家公园自西向东分别属于中山、中低山和丘陵地貌区，其土壤类型亦有所不同。武夷山国家公园西部自最高峰黄岗山山顶向下至 1900 米为山地草甸土，海拔 1050 ～ 1900 米为黄壤，海拔 700 ～ 1050 米为黄红壤，海拔 700 米以下为红壤。山地草甸土母质以火山岩为主，可分为山地草甸土、泥炭质草甸土和黄壤性草甸土 3 个亚类。黄壤成土母质以火山岩为主，黄红壤成土母质以粗晶花岗岩为主，红壤成土母质以粗晶花岗岩为主。

武夷山国家公园中部土壤主要为花岗岩和砂岩所发育而成的土壤，以山地红壤为主，少数为粗骨性红壤，山洼及山坡下有少量暗红壤，多为中厚土层，腐殖质含量均在中等以上，此种土壤为林木的生长和植物的繁衍提供了良好的条件。武夷山国家公园东部自然土壤的母质主要为本区红层，其次为第四纪松散堆积物，主要土壤类型为红壤和红黄壤、酸性紫色壤。

三、植被

依据《中国植被》的植被分类原则、系统和单位，并参考《福建植被》，武夷山国家公园除典型的地带性植被——常绿阔叶林外，还有温性针叶林、暖性针叶林、温性针叶阔叶混交林、常绿落叶阔叶混交林、竹林、常绿阔叶灌丛、落叶阔叶林、落叶阔叶灌丛、灌草丛、草甸等 10 个植被型，这 11 个植被型共包含 15 个植被亚型、25 个群系组、56 个群系、170 多个群丛组，囊括了中国中亚热带地区所有植被类型。

武夷山国家公园具有世界同纬度带现存最典型、面积最大、保存最完整的中亚热带原生性森林生态系统，随着海拔的递增，气温的递减和降水量的增多，依次分布有常绿阔叶林带、针阔叶混交林带、温性针叶林带、中山苔藓矮曲林带和中山草甸带 5 个垂直带谱，植被垂直带谱明显。国家公园内还分布有 210.7 平方千米的原生性森林植被未受到人为破坏，是我国亚热带东部地区森林植被保存最完好的区域。

常绿阔叶林带，海拔 300 ～ 1500 米，常绿阔叶林是武夷山国家公园的代表性群落，分布面积最为广阔，占国家公园森林现存面积的四分之一。由于气候温和湿润，林下为发育较好的酸性的亚热带山地红壤和黄红壤。植被繁茂，树冠呈伞状，以中小型革质叶组成的林冠为特征。群落结构比较简单，乔木层通常只有两层，林中藤本植物比较少。

针阔叶混交林带，海拔 1100 ～ 1600 米，土质为黄红壤至黄壤，在黄岗山分布面积较大，多为次生针阔混交林。针叶树主要有黄山松、南方铁杉、杉木、马尾松、柳杉、粗榧等。阔叶树主要有木荷、甜槠、缺萼枫香、浙闽樱、青冈、丝栗栲、米槠、大叶野樱、东方古柯、多脉青冈、石栎等。在群落覆盖度大、林内阴湿之处，附生喜温湿的热带和亚热带苔藓植物种类丰富。在一些松树干基部还经常附生有灰藓、平藓和叶状地衣。草本层中含有较多的蕨类和苔藓植物，成为针阔混交林的特色之一。

温性针叶林带，海拔 1500 ～ 1800 米，土质仍以山地黄壤为主，土层厚。树种为马尾松、杉木、柳杉等亚热带暖性树种和黄山松、南方铁杉等亚热带温性树种，杂生阔叶树，林下阴湿，灌木层发育良好。

山地苔藓矮曲林带，海拔 1700 ～ 1900 米，土质为黄壤，腐殖质增厚。这一林带的树种以落叶树为主，常绿树为辅，因山高风大、气温低、雨量多、潮湿等影响，林内阴湿，树木生长低矮，树干弯曲且多分枝，树干上附生大量苔藓植物，形成特殊的群落变形。林冠致密，通常可分为乔木、灌木、草本 3 层。

中山草甸带，海拔 1800 ～ 2160 米，土质属山地草甸土，土层厚达 50 毫米，生境极为特殊，温度低、湿度大、风大、雾日长、雨量充沛。群落总覆盖率为 80%～ 95%，草丛不高，主要由疏散禾本科、莎草科草本植物组成，并散有矮化黄山松及少量灌木。植物群落的外观低矮平整，季节变化明显。

四、生物多样性

武夷山国家公园特殊的地理位置和复杂的地貌使其生物多样性非常丰富。区内保存了世界同纬度带最完整、最典型、面积最大的中亚热带原生性森林生态系统，发育有明显的植被垂直带谱：随海拔递增，依次分布着常绿阔叶林带、针阔叶混交林带、温性针叶林带、中山苔藓矮曲林带和中山草甸带等 5 个植被带，分布着南方铁杉、小叶黄杨、武夷玉山竹

等珍稀植物群落，几乎囊括了中国亚热带所有的原生性常绿阔叶林和岩生性植被群落。

位于武夷山国家公园腹地的挂墩、大竹岚更是备受全球生物界瞩目的“生物模式标本产地”。据科学资料记载，一百多年来中外生物学家在此发现的模式标本达 1000 多种，尤其以种类众多的动物模式标本而闻名于世。无论是从物种多样性、遗传多样性，还是从生态系统多样性来说，武夷山国家公园在中国和全球生物多样性保护中都具有关键意义。

已知定名的植物有 2799 种，分属于 269 科。包括苔藓植物 70 科 345 种、蕨类植物 40 科 314 种、裸子植物 7 科 26 种和被子植物 152 科 2114 种（包括亚种和变种）。此外，还记录藻类 73 科 191 属 239 种、真菌 38 科 83 属 503 种、地衣 13 科 35 属 100 种。这些物种既有大量亚热带的物种，也有从北方温带分布到这里的种类和从南方热带延伸到这里的种类，具有很高的植物物种丰富度。

野生动物种类繁多，共记录野生脊椎动物 5 纲 35 目 125 科 332 属 558 种，包括哺乳类 8 目 23 科 56 属 79 种、鸟类 21 目 77 科 222 属 388 种、爬行类 2 目 17 科 52 属 80 种、两栖类 2 目 10 科 26 属 35 种、鱼类 5 目 16 科 41 属 62 种，占福建省野生脊椎动物的 33.27%，此外区内还记载贝类 4 目 16 科 27 种，寄生蠕虫 43 科 112 种，螨类 15 科 140 种。模式产地为武夷山的野生脊椎动物 57 种，其中以当地地名命名的 10 种。

五、鸟类科考情况

武夷山国家公园有“奇秀甲东南”的美称。鸟类科考和调查有 140 年的历史，从 19 世纪开始，武夷山就以丰富的鸟类著名。第一个在武夷山进行大规模生物学考察和生物学收集的西方人是法国生物学家、传教士 David（曾因发现四川大熊猫闻名于世），于 1873 年 10 月初到闽赣交界的王毛寨，随后进入了福建西北地处武夷山区的崇安挂墩，他们一行在此发现 8 个鸟类新亚种，包括短尾鸦雀、棕噪鹛、红尾噪鹛、灰眶雀鹛、褐顶雀鹛、灰头鸦雀等。

受 David 在挂墩采集到不少鸟类新种的启发，英国人 La Touche 利用在福建任职的机会到武夷山区收集动物标本。1896 至 1898 年间，他和鸟类学爱好者 Rickett，到福建武夷山的挂墩和大竹岚进行了一段时间的动物标本收集工作，他们在那里采集到 2 个新种和 13 个新亚种，如金色鸦雀、黑颏凤鹛、高山短翅莺等，并在综合历年来在我国东部收集到的鸟类资料的基础上，于 1925 ～ 1935 年撰写出版了《华东鸟类手册》，书中记录了鸟类 750 种和亚种，此书被西方人认为是继 David 的《中国的鸟类》以后，有关中国鸟类学方面较好的一本专著。从此，挂墩、麻粟等地名扬名世界生物界。

之后，美国生物学者 Pope 于 1925 年 6 月到达武夷山挂墩一带进行野外考察和采集标本。1926 年 5 月，英国标本商 Smith 在几个外国人组建的一个“中国科学和艺术会”的资助下到达三港，采集到兽类、鸟类和两栖爬行动物标本约 280 号，其中鸟类新种 27 种，包括黄腹角雉。

国内最早对武夷山鸟类进行研究的是郑作新院士。抗战期间，福建私立协和大学内迁福建邵武，郑作新教授率队深入武夷山采集，他和李铭新联名发表《福建挂墩概述》，除了记述他们 1938 年采集的情况外，还对以前外国人在挂墩一带采集情况作了一些概述，是一篇很有价值的史料。郑作新、江智华、唐瑞干（1981）等在 1938 ～ 1943 年在武夷山脉附近的邵武、崇安（现武夷山市）、建阳等地进行鸟类考察，计 234 种（3 个亚种），分隶于 47 科 18 目，还统计了以武夷山地区为其模式标本产地的鸟类新种和亚种，新种有 4 种，新亚种达 31 个。

新中国成立后，福建师范大学、厦门大学等高等院校相关师生，多次到福建武夷山三港、桐木、挂墩一带采集动植物标本和教学实习。1979 年，福建省科学技术委员会组织福建省内有关科研院所和高校以及北京、上海、江苏、广东、天津、江西等地的动物、植物、微生物、地理、地貌、环境等学科的科研人员组成了综合科学考察队，对福建武夷山国家级自然保护区进行为期十年的综合科学考察。据调查，保护区分布鸟类有 195 种（亚种），隶属于 14 目 36 科，其中黑冠鹃隼为福建鸟类新记录。

在综合前人调查资料的基础上，吴浩瀚、蔡光贤（1994）统计出在武夷山自然保护区记载发现的鸟类共计 17 目 47 科 256 种，该鸟类名录主要是参考郑作新的《福建武夷山地区鸟类区系初探》和石溥（1993）的《武夷山自然保护区野生动物考察报告》。

陈家玉（2001）在 2000 年 6 ～ 9 月和 2001 年 4 ～ 6 月对原福建武夷山国家级风景名胜区夏季鸟类群落进行了调查，计 74 种，隶属于 12 目 28 科，其中国家二级重点保护鸟类 7 种。1998 年和 2002 年以及 2006 年 1 月，谢少和对福建武夷山挂墩鸟类资源进行调查，记录到鸟类 70 种。

2007 ～ 2009 年，在福建省科技厅的支持下，由福建省武夷山生物研究所牵头，建设中国福建武夷山生物多样性研究信息平台，负责对福建武夷山鸟类多样性进行进一步的研究。通过对武夷山地区鸟类资源的深入调查，共发现保护区新记录鸟类 7 种，即黑翅鸢、蛇雕、斑头大翠鸟、灰背椋鸟、黑领椋鸟、灰林鹏、虎斑地鸫；根据新的分类系统，由亚种另分为种的 2 种：黑背白鹡鸰普通亚种、栗臀鸲。并统计出武夷山国家公园分布的鸟类共计 268 种，分隶于 18 目 49 科。并通过对武汉大学动物标本馆、复旦大学动物标本馆、中山大学动物标本馆、上海师范大学动物标本馆、福建省博物馆、福建师范大学动物标本馆、福建万木林省级自然保护区生物标本室等进行调查，全面了解上述标本馆对武夷山区域鸟类标本馆藏情况。

2006 年 10 月到 2011 年 7 月，福建师范大学唐兆和、唐庆圆组织对武夷山景区的鸟类调查，共记录鸟类 162 种，隶属于 15 目 45 科，包括斑头大翠鸟、乌雕、白尾鹞。

近年来，陆续有不少科研单位、观鸟拍鸟爱好者在武夷山国家公园观察、拍摄、记录鸟类，武夷山国家公园管理局、福建省武夷山生物研究所分别组织、支持武夷山本地观鸟拍鸟爱好者进行了多年不间断的鸟类调查活动，这些爱好者踏遍武夷山国家公园的山山水水，积累了大量的鸟类数据资料和图片，为查清武夷山国家公园的鸟类，维护“鸟的天堂”这一称号立下了汗马功劳。

雁形目 ANSERIFORMES

大中型游禽。喙宽而扁，有些具钩，喙端具角质喙甲。脚具蹼，善游水。大多数种类雌雄异色。杂食性，食物从水生植物、藻类到水生昆虫、软体动物、鱼类等。大多数种类具迁徙习性。全国广布。中国有 1 科 24 属 61 种，武夷山国家公园有 1 科 10 属 21 种。

鸭科 Anatidae

LC : 70 ~ 85 cm

豆雁
Anser fabalis

【英文名】Taiga Bean Goose
【国内分布状况】除西南地区、青藏高原外全国可见。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10 ～ 12）。状况：少见。





NR : 65 ~ 85 cm

短嘴豆雁
Anser serrirostris

【英文名】Tundra Bean Goose
【国内分布状况】我国东部最常见的雁类，主要越冬于长江流域及其以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（1、10 ～ 12）。状况：少见。



LC : 70 ~ 85 cm

II

白额雁
Anser albifrons

【英文名】Greater White-fronted Goose
【国内分布状况】迁徙时经过我国东部各地，越冬于长江中下游及其以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10 ～ 12）。状况：少见。

LC : 115 ~ 150 cm

II

小天鹅
Cygnus columbianus

【英文名】Tundra Swan
【国内分布状况】迁徙时经过西北、东北及华北，越冬于长江中下游地区及其以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（1 ～ 3、10 ～ 12）。状况：少见。

左为成鸟，右为亚成鸟

LC : 40 ~ 50 cm

鸳鸯
Aix galericulata

II

【英文名】Mandarin Duck

【国内分布状况】繁殖于长江以北的中东部地区、西南地区，越冬于华北、东南、华南、西南。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～3、11、12）。状况：易见。

左为雄鸟，右为雌鸟

LC : 30 ~ 38 cm

棉凫
Nettapus coromandelianus

II

【英文名】Cotton Pygmy Goose

【国内分布状况】主要分布于四川中部至西南部、长江中下游以南地区，偶见于华北及台湾。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（5）。状况：罕见。



2014 年 5 月 19 日和 2019 年 5 月 26 日在武夷山国家公园武夷山市区域分别有单羽雄鸟记录（左一及左三为雄鸟，左二为雌鸟）

2017 年～ 2021 年在武夷山国家公园崇阳溪河段均有过境记录

LC : 35 ~ 43 cm

花脸鸭
Sibirionetta formosa

II

【英文名】
Baikal Teal

【国内分布状况】
越冬于华东、华中、华南的一些地区，包括海南和台湾。迁徙时经过东北和华北。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、11）。状况：罕见。

LC : 45 ~ 55 cm

赤膀鸭
Mareca strepera

【英文名】Gadwall

【国内分布状况】繁殖于东北北部及新疆西部，越冬于西南、长江中下游及其以南地区，包括海南和台湾。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（3、11）。状况：罕见。



2014 年 3 月 29 日、2019 年 11 月 9 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段分别有单羽和一对记录（左为雌鸟，右为雄鸟）

LC : 65 ~ 85 cm

白眉鸭
Spatula querquedula

【英文名】
Garganey
【国内分布状况】
繁殖于新疆和东北，越冬于华南和东南沿海，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（3、4、10）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟


雄鸟


雌鸟

LC : 44 ~ 50 cm

琵嘴鸭
Spatula clypeata

【英文名】
Northern Shoveler
【国内分布状况】
繁殖于东北及西北，越冬于华南，包括海南和台湾。迁徙经过国内大部分地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（3、10、11）。状况：易见。



NT : 45 ~ 55 cm

罗纹鸭
Mareca falcata

【英文名】Falcated Duck

【国内分布状况】繁殖于黑龙江和吉林，越冬于长江中下游和华南，包括海南和台湾。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（1、10、12）。状况：罕见。

雄鸟


前为雌鸟

2015 年 10 月 18 日、2018 年 1 月 7 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段分别有单羽和二羽雄鸟记录

LC : 40 ~ 50 cm

赤颈鸭
Mareca penelope

【英文名】Eurasian Wigeon

【国内分布状况】繁殖于东北地区，越冬于黄河流域及其以南大部分地区，包括海南和台湾。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（11、12）。状况：易见。

雄鸟



雌鸟

LC : 58 ~ 63 cm

斑嘴鸭
Anas zonorhyncha

【英文名】Chinese Spot-billed Duck

【国内分布状况】全国均有分布，北方的部分繁殖种群在冬季南迁越冬，南方的留鸟种群呈扩大趋势。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留、冬。状况：常见。



左为雄鸟，右为雌鸟

LC : 55 ~ 65 cm

绿头鸭
Anas platyrhynchos

【英文名】
Mallard

【国内分布状况】
全国均有分布，北方的繁殖种群冬季南迁越冬，南方的留鸟种群呈扩大趋势。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 3、10 ～ 12）。状况：易见。



LC : 50 ~ 75 cm

针尾鸭
Anas acuta

【英文名】
Northern Pintail
【国内分布状况】
繁殖于新疆西北部及西藏南部，越冬于长江以南大部分地区，包括海南和台湾，迁徙时经过东北、华北和长江中下游地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（1、2、12）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

LC : 35 ~ 38 cm

绿翅鸭
Anas crecca

【英文名】Eurasian Teal
【国内分布状况】繁殖于东北、新疆西北部，越冬于长江流域及其以南各地，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～4、10～12）。状况：常见。

左为雄鸟，右为雌鸟





LC : 34 ~ 50 cm

凤头潜鸭
Aythya fuligula

【英文名】
Tufted Duck

【国内分布状况】
繁殖于我国西北和东北，越冬于长江流域及其以南各地，迁徙时经过我国大部分地区。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1～4、11）。状况：易见。

雄鸟


雌鸟



LC : 40 ~ 50 cm

斑背潜鸭
Aythya marila

【英文名】Greater Scaup
【国内分布状况】迁徙季节少见于我国东部，越冬于长江流域至华南地区，包括台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1、2、11、12）。状况：罕见。


雄鸟


雌鸟（陈存思 摄）

2019 年冬季和 2020 年冬季在武夷山国家公园景区崇阳溪河段分别有单羽越冬记录

LC : 50 ~ 60 cm

红胸秋沙鸭
Mergus serrator

【英文名】Red-breasted Merganser
【国内分布状况】主要见于我国东北、华北、华东及华南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（1）。状况：罕见。


雄鸟（宋炜东 摄）

雌鸟（宋炜东 摄）

标本分别采集于武夷山国家公园邵武市区域和武夷山市区域，
现分别藏于福建师范大学动物标本馆和武夷山青少年生物考察基地标本馆

LC : 55 ~ 68 cm

普通秋沙鸭
Mergus merganser

【英文名】
Common Merganser
【国内分布状况】
见于海南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（2、12）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

2019 年 12 月 8 日～ 10 日衷伯夷等在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽雌鸟记录

EN : 48 ~ 64 cm

中华秋沙鸭
Mergus squamatus

【英文名】Scaly-sided Merganser

【国内分布状况】繁殖于我国东北，迁徙时经过华北，越冬于长江流域至华南各地。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1、2、11、12）。状况：少见。

I



雄鸟



雌鸟

鸡形目 GALLIFORMES

主要在地面取食的陆禽。喙尖而有力，脚强健而善于奔跑和刨食。有些种类雌雄异色，雄鸟羽色更为醒目和艳丽，体羽颜色丰富。杂食性，主要取食植物种子和果实，也捕食小型无脊椎动物。大多数种类不善飞行。留鸟，极少数具迁徙习性。全国广布。中国有 1 科 27 属 64 种，武夷山国家公园有 1 科 10 属 10 种。

雉科 Phasianidae

LC : 28 ~ 35 cm

中华鹧鸪
Francolinus pintadeanus

【英文名】
Chinese Francolin
【国内分布状况】
分布于南方各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：罕见。

2014 年 5 月 21 日和 2016 年 1 月 19 日在武夷山国家公园武夷山市区域各有单羽记录

NT : 15 ~ 20 cm

鹌鹑
Coturnix japonica

【英文名】
Japanese Quail
【国内分布状况】
繁殖于东北及华北地区，越冬于长江以南各地，部分个体越冬于华北。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 5、10 ～ 12）。状况：常见。

LC : 12 ~ 15 cm

蓝胸鹑
Excalfactoria chinensis

【英文名】King Quail
【国内分布状况】偶见于云南东南部、贵州、广西、广东、海南、福建和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：罕见。

标本 10 月采集于武夷山国家公园邵武市区域，现标本去向不明

NT : 25 ~ 30 cm

白眉山鹧鸪
Arborophila gingica

II

【英文名】
White-necklaced Partridge

【国内分布状况】
中国鸟类特有种。广泛分布于我国东南、华南等山地和丘陵地区。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 30 ~ 35 cm

灰胸竹鸡
Bambusicola thoracicus

【英文名】Chinese Bamboo Partridge
【国内分布状况】中国鸟类特有种。主要分布于南方各地（海南、台湾除外）。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC 55 ~ 63 cm ♂
42 ~ 48 cm ♀

勺鸡
Pucrasia macrolopha

II

【英文名】
Koklass Pheasant
【国内分布状况】
广布于我国华北至华南、西南山地及喜马拉雅山区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

LC 90 ~ 130 cm ♂
70 ~ 90 cm ♀

白鹇
Lophura nycthemera

II

【英文名】Silver Pheasant
【国内分布状况】广布于长江以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。
模式标本产地：武夷山国家公园

左为雌鸟，右为雄鸟

VU 55 ~ 63 cm ♂
45 ~ 50 cm ♀

黄腹角雉
Tragopan caboti

I

【英文名】
Cabot's Tragopan

【国内分布状况】
中国鸟类特有种。主要分布于浙江、江西、福建、广东、湖南、广西。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

雌鸟

幼鸟


雄鸟

LC 80 ~ 100 cm ♂
55 ~ 65 cm ♀

雉鸡
Phasianus colchicus

【英文名】Common Pheasant
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

NT 80 ~ 90 cm ♂
45 ~ 50 cm ♀

白颈长尾雉
Syrmaticus ellioti

【英文名】Elliot's Pheasant
【国内分布状况】中国鸟类特有种。分布于安徽、浙江、江西、湖南、广东、广西和福建。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。

I

雄鸟

幼鸟


雌鸟

鹱形目 PROCELLARIIFORMES

主要在地面取食的陆禽。喙尖而有力，脚强健而善于奔跑和刨食。有些种类雌雄异色，雄鸟羽色更为醒目和艳丽，体羽颜色丰富。杂食性，主要取食植物种子和果实，也捕食小型无脊椎动物。大多数种类不善飞行。留鸟，极少数具迁徙习性。全国广布。中国有 1 科 27 属 64 种，武夷山国家公园有 1 科 10 属 10 种。

海燕科 Hydrobatidae

NT : 18 ~ 22 cm

黑叉尾海燕
Oceanodroma monorhis

【英文名】Swinhoe's Storm Petrel
【国内分布状况】繁殖于黄海、东海和南海及附近岛屿。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：迷（9）。状况：罕见。

2016 年 9 月 19 日受台风“莫兰蒂”影响在武夷山国家公园桐木段有单羽迷鸟记录

䴙䴘目 PODICIPEDIFORMES

中小型游禽。形态似鸭而喙尖且直，雌雄同色，体羽以灰褐色、黑色和栗色为主。脚具瓣蹼，喜潜水觅食。主要分布于河流、湖泊、沼泽和水塘等淡水水域，主要以鱼类、水生昆虫和甲壳类动物为食。多数种类具迁徙习性。全国广布。中国有 1 科 2 属 5 种，武夷山国家公园有 1 科 2 属 2 种。

䴙䴘科 Podicipedidae

LC : 45 ~ 50 cm

凤头䴙䴘
Podiceps cristatus

【英文名】Great Crested Grebe
【国内分布状况】见于海南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（3、4、10、11）。状况：易见。

LC : 23 ~ 28 cm

小䴙䴘
Tachybaptus ruficollis

【英文名】
Little Grebe
【国内分布状况】
广布于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：易见。



非繁殖羽

白化现象



繁殖羽

鹳形目 CICONIIFORMES

大型涉禽。喙粗长，喙基较厚，颈和脚细长。雌雄同色，体羽多以黑色、白色、红色和黄棕色为主，尾较短。以鱼类、两栖爬行类和昆虫甚至腐肉为食。分布于温带的种类具迁徙习性。中国有 1 科 4 属 7 种，武夷山国家公园有 1 科 1 属 1 种。

鹳科 Ciconiidae

LC : 100 ~ 120 cm

黑鹳 *Ciconia nigra*

【英文名】Black Stork

【国内分布状况】见于西藏除外的全国各地。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

I



亚成鸟

2015 月 4 月 12 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽记录

鹈形目 PELECANIFORMES

中大型涉禽和游禽。上喙具鼻沟，喙长、腿长、颈长，鹈鹕具独特的喉囊。雌雄同色，脚具全蹼或蹼不发达（鹮科和鹭科）。多单独或集群栖息于江河、湖泊、沼泽和沿海等湿地生境。喜食鱼类、两栖爬行类、昆虫乃至小型哺乳动物。多数种类具迁徙习性。全国广布。中国有 3 科 15 属 35 种，武夷山国家公园有 2 科 10 属 14 种。

鹮科 Threskiornithidae

LC : 80 ~ 95 cm

白琵鹭
Platalea leucorodia

II

【英文名】Eurasian Spoonbill

【国内分布状况】繁殖于东北和西北，迁徙经华北、西北和西南，越冬于长江流域及其以南地区。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

2019 年 10 月 19 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽记录



鹭科 Ardeidae

LC : 30 ~ 40 cm

黄苇鳽
Ixobrychus sinensis

【英文名】
Yellow Bittern
【国内分布状况】
见于新疆、青海、西藏除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（5～10）。状况：易见。

雌鸟

雄鸟

雌鸟

LC : 40 ~ 42 cm

栗苇鳽
Ixobrychus cinnamomeus

【英文名】Cinnamon Bittern
【国内分布状况】分布于北起东北南部、向西南至云南西部以东的广大地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（5～11）。状况：常见。

雌鸟

雌鸟

雄鸟

雄鸟

LC : 55 ~ 65 cm

黑鳽
Ixobrychus flavicollis

【英文名】
Black Bittern
【国内分布状况】
繁殖于华中、华东至华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（5～10）。状况：少见。

EN : 54 ~ 56 cm

海南鳽
Gorsachius magnificus

【英文名】White-eared Night Heron
【国内分布状况】分布于华中、华东、华南和西南地区，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（2～9）。状况：罕见。

I

标本采集于武夷山国家公园武夷山市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆

LC : 55 ~ 65 cm

夜鹭

Nycticorax nycticorax

【英文名】

Black-crowned Night Heron

【国内分布状况】

分布于全国各地。

【国家公园分布状况】

居留类型（月份）：留。

状况：常见。

亚成鸟

亚成鸟

LC : 35 ~ 48 cm

绿鹭
Butorides striata

【英文名】Striated Heron
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 42 ~ 52 cm

池鹭
Ardeola bacchus

【英文名】
Chinese Pond Heron
【国内分布状况】
分布于西藏除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

繁殖羽

繁殖羽

非繁殖羽

非繁殖羽

非繁殖羽

非繁殖羽

非繁殖羽

繁殖羽

NR : 45 ~ 53 cm

牛背鹭
Bubulcus coromandus

【英文名】
Eastern Cattle Egret
【国内分布状况】
分布于全国各地，在长江以南多为留鸟，在长江以北为夏候鸟。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～10）。状况：易见。

繁殖羽

非繁殖羽

LC : 92 ~ 99 cm

苍鹭
Ardea cinerea

【英文名】
Grey Heron
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（2～10）。状况：常见。

LC : 85 ~ 95 cm

草鹭
Ardea purpurea

【英文名】
Purple Heron
【国内分布状况】
在东北、华北、华东和华中为夏候鸟，在华南为留鸟或冬候鸟。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、10）。状况：少见。

LC : 60 ~ 70 cm

中白鹭
Ardea intermedia

【英文名】Intermediate Egret
【国内分布状况】主要繁殖于长江以南，越冬于福建、广东、海南和台湾等地，偶见于华北。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（4 ～ 10）。状况：易见。

LC : 90 ~ 98 cm

大白鹭
Ardea alba

【英文名】
Great Egret
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（3～10）。状况：易见。

LC : 55 ~ 65 cm

白鹭
Egretta garzetta

【英文名】Little Egret
【国内分布状况】全国各地均有分布。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

鲣鸟目 SULIFORMES

大中型海洋性鸟类。喙粗长，上喙具鼻沟，尖端带钩明显。雌雄同色，体羽以黑色、白色、红色和褐色为主。两翼尖长或短圆；脚短且多具全蹼。多栖息于海洋、湖泊和河流等湿地，飞行能力强。多数种类善于游泳和潜水，以鱼类和其他水生动物为食。中国有 3 科 4 属 12 种，武夷山国家公园有 2 科 2 属 2 种。

军舰鸟科 Fregatidae

LC : 66 ~ 81 cm

白斑军舰鸟
Fregata ariel

II

【英文名】
Lesser Frigatebird
【国内分布状况】
偶见于东南沿海。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：迷（5）。状况：罕见。

2018 年 5 月 5 日在武夷山国家公园武夷山市区域水库有单羽记录

鸬鹚科 Phalacrocoracidae

LC : 75 ~ 95 cm

普通鸬鹚
Phalacrocorax carbo

【英文名】Great Cormorant
【国内分布状况】全国各地均有分布，在北方多为旅鸟和夏候鸟，在南方多为冬候鸟和留鸟。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、11、12）。状况：易见。

繁殖羽

非繁殖羽

鹰形目 ACCIPITRIFORMES

以肉食性为主的猛禽，体型大小不一。喙强壮带钩，基部覆蜡膜，上喙具锤状突或双齿突。雌雄大多同色，但一般雌性个体略大于雄性，羽色多以褐色、白色、黑色和棕色为主。翼型多样，善飞行；脚大多强健有力，具锋利而弯曲的爪。主要为肉食性，超过一半的种类具有迁徙习性。中国有 2 科 24 属 55 种，武夷山国家公园有 2 科 13 属 21 种。

鹗科 Pandionidae

LC : 55 ~ 62 cm

鹗
Pandion haliaetus

II

【英文名】
Western Osprey
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1、2、10 ～ 12）。
状况：少见。

鹰科 Accipitridae

LC : 34 ~ 40 cm

黑翅鸢
Elanus caeruleus

II

【英文名】Black-winged Kite
【国内分布状况】分布于华南、华东各地，近年种群呈北扩趋势。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 57 ~ 61 cm

凤头蜂鹰
Pernis ptilorhynchus

II

【英文名】
Crested Honey-buzzard
【国内分布状况】
繁殖于东北、西南等地，迁徙季节全国均可见。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

2013 年 10 月 5 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 28 ~ 35 cm

黑冠鹃隼
Aviceda leuphotes

II

【英文名】
Black Baza
【国内分布状况】
繁殖于华中、华东、华南及西南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：易见。

LC : 65 ~ 74 cm

蛇雕
Spilornis cheela

II

【英文名】Crested Serpent Eagle
【国内分布状况】分布于西南、东南及华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

（杨林 摄）

亚成鸟

LC : 64 ~ 84 cm

II

鹰雕
Nisaetus nipalensis

【英文名】Mountain Hawk-Eagle
【国内分布状况】主要分布于中国南方森林地带。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。

（吴群阵 摄）

亚成鸟

VU : 61 ~ 74 cm

I

乌雕
Clanga clanga

【英文名】Greater Spotted Eagle
【国内分布状况】见于全国大部分地区，多为各地少见候鸟或旅鸟。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（3）。状况：罕见。

（董文晓 摄）

（董文晓 摄）

参见郑作新、江智华、唐瑞干著《福建武夷山地区鸟类区系初探》

LC : 67 ~ 81 cm

林雕
Ictinaetus malaiensis

II

【英文名】
Black Eagle
【国内分布状况】
分布于长江以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：常见。

白化现象

标本采集于武夷山国家公园邵武市区域，
现分别藏于福建师范大学动物标本馆和福建省博物馆

EN : 70 ~ 82 cm

草原雕
Aquila nipalensis

I

【英文名】
Steppe Eagle
【国内分布状况】
多分布于西部、东北部地区。近年来种群数量呈下降趋势。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（3）。状况：罕见。

LC : 55 ~ 67 cm

白腹隼雕
Aquila fasciata

II

【英文名】Bonelli's Eagle
【国内分布状况】分布于长江流域及其以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：罕见。

（张涟 摄）

2016 年 5 月 18 日和 2020 年 3 月 18 日
在武夷山国家公园武夷山市区域各有单羽记录

LC : 40 ~ 50 cm

凤头鹰
Accipiter trivirgatus

II

【英文名】
Crested Goshawk
【国内分布状况】
分布于长江流域及其以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

雄鸟

LC : 25 ~ 35 cm

赤腹鹰
Accipiter soloensis

II

【英文名】
Chinese Sparrowhawk
【国内分布状况】
分布于中部、东部各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：易见。

雌鸟

雄鸟

LC : 23 ~ 30 cm

日本松雀鹰
Accipiter gularis

II

【英文名】
Japanese Sparrowhawk

【国内分布状况】
繁殖于东北、华北，迁徙季节全国可见。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 3、11、12）。状况：少见。

亚成鸟

LC : 26 ~ 35 cm

松雀鹰
Accipiter virgatus

II

【英文名】
Besra

【国内分布状况】
见于中部、东北、华东、西南、华南，包括海南。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 3、11、12）。状况：少见。

LC : 30 ~ 40 cm

II

雀鹰
Accipiter nisus

【英文名】Eurasian Sparrowhawk
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～4、11、12）。状况：罕见。

雄鸟

雄鸟

雌鸟

2014 年 3 月 22 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 47 ~ 60 cm

II

苍鹰
Accipiter gentilis

【英文名】Northern Goshawk
【国内分布状况】繁殖于东北、西北和西南部分地区，越冬于西北、东北、华北及南方多数地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（11）。状况：罕见。

亚成鸟

2016 年 11 月 27 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 43 ~ 55 cm

白尾鹞
Circus cyaneus

II

【英文名】Hen Harrier
【国内分布状况】繁殖于东北、华北地区，迁徙经华北、华南、华东等地，越冬于华南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（3、4、11）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

2021 年 4 月 5 日在武夷山国家公园武夷山市区域有单羽记录

LC : 41 ~ 50 cm

鹊鹞
Circus melanoleucos

II

【英文名】Pied Harrier
【国内分布状况】繁殖于东北、华北地区，迁徙经华北、华南、华东等地，越冬于华南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、10）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

2018 年 10 月 21 日和 2021 年 4 月 15 日分别在武夷山国家公园武夷山市区域有单羽记录

LC : 54 ~ 65 cm

黑鸢
Milvus migrans

II

【英文名】Black Kite
【国内分布状况】广布于全国大部分地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～3、10～12）。状况：易见。

LC : 39 ~ 45 cm

灰脸鵟鹰
Butastur indicus

II

【英文名】
Grey-faced Buzzard
【国内分布状况】
见于东北、华东、华中、华北和西南地区，越冬于华南，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（3、4）。状况：少见。

LC : 45 ~ 60 cm

普通鵟
Buteo japonicus

II

【英文名】Eastern Buzzard

【国内分布状况】广泛分布于中国东部地区，在东北地区为夏候鸟，在华南、华东为冬候鸟。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～3、11、12）。状况：常见。

鹤形目 GRUIFORMES

体型多样的涉禽和游禽。喙细长而尖，颈长。多数具较强飞行能力。脚长，有的具蹼蹼，后趾不发达或较前趾稍高。雌雄同色。以昆虫、鱼虾、小型两栖爬行类和小型哺乳动物为食，也吃植物的种子、根茎、叶芽和果实。中国有 2 科 16 属 30 种，武夷山国家公园有 2 科 8 属 10 种。

秧鸡科 Rallidae

LC : 23 ~ 30 cm

普通秧鸡
Rallus indicus

【英文名】
Brown-cheeked Rail
【国内分布状况】
见于新疆、西藏、海南除外的全国各地，北方的种群多为夏候鸟，繁殖期后南迁越冬。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（3）。状况：少见。

LC : 25 ~ 30 cm

蓝胸秧鸡
Lewinia striatia

【英文名】
Slaty-breasted Rail
【国内分布状况】
分布于长江流域及其以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（6）。状况：罕见。



2014 年 6 月 15 日在武夷山国家公园景区南源岭农田有单羽记录

LC : 30 ~ 35 cm

黑水鸡
Gallinula chloropus

【英文名】
Common Moorhen
【国内分布状况】
分布于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：常见。



LC : 35 ~ 38 cm

骨顶鸡
Fulica atra

【英文名】Eurasian Coot
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（9、11、12）。状况：少见。



LC : 26 ~ 28 cm

红脚苦恶鸟
Zapornia akool

【英文名】
Brown Crake
【国内分布状况】
分布于华中、华南和华东地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：少见。

LC : 15 ~ 20 cm

小田鸡
Zapornia pusilla

【英文名】Baillon's Crake
【国内分布状况】繁殖于东北至西北地区，迁徙时见于我国大部分地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、10）。状况：罕见。

2020 年 4 月 13 日陈存恩在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽记录

LC : 19 ~ 23 cm

红胸田鸡
Zapornia fusca

【英文名】
Ruddy-breasted Crake

【国内分布状况】
繁殖于东北至中部、东部大部分地区，冬季南迁，台湾有留鸟分布。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：少见。

LC : 38 ~ 43 cm

董鸡
Gallicrex cinerea

【英文名】
Watercock

【国内分布状况】
见于西北地区除外的全国各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（6、7）。状况：罕见。

2019 年 6 月 15 日、2019 年 7 月 13 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 28 ~ 33 cm

白胸苦恶鸟
Amaurornis phoenicurus

【英文名】
White-breasted Waterhen

【国内分布状况】
主要分布于西南、华中、华东和华南地区。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：常见。

鹤科 Gruidae

LC : 95 ~ 125 cm

灰鹤
Grus grus

【英文名】Common Crane

【国内分布状况】繁殖于我国东北、西北，越冬于华北、华中、西南和江西鄱阳湖地区，偶至华东和华南地区，包括台湾。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

Ⅱ

标本采集于武夷山国家公园邵武市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆

鸻形目 CHARADRIIFORMES

与湿地紧密联系的涉禽和游禽，包含多个类群，形态变化多样。喙型从粗短到细长，从反嘴到勺嘴，变化多端。多雌雄同色，部分物种在繁殖期雌雄异色。栖息于各种湿地类型，主要以软体动物、昆虫、鱼类为食。多数具有迁徙习性。中国有 13 科 49 属 137 种，武夷山国家公园有 8 科 24 属 45 种。

三趾鹑科 Turnicidae

LC : 15 ~ 18 cm

黄脚三趾鹑
Turnix tanki

【英文名】
Yellow-legged Buttonquail
【国内分布状况】
从东北至华南、西南均有分布。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

标本采集于武夷山国家公园武夷山市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆

LC : 14 ~ 18 cm

棕三趾鹑
Turnix suscitator

【英文名】
Barred Buttonquail
【国内分布状况】
见于云南、贵州、湖北、重庆、四川、福建、广东、香港、广西、海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

2020 年 4 月 25 日在武夷山国家公园武夷山市区域内有一对记录

反嘴鹬科 Recurvirostridae

LC : 35 ~ 40 cm

黑翅长脚鹬
Himantopus himantopus

【英文名】
Black-winged Stilt
【国内分布状况】
繁殖于东北、西北及华北地区，迁徙经全国各地，越冬于华南地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、6、9）。状况：易见。

LC : 42 ~ 45 cm

反嘴鹬
Recurvirostra avosetta

【英文名】Pied Avocet
【国内分布状况】见于青藏高原除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（12）。状况：少见。



鸻科 Charadriidae

NT : 30 ~ 35 cm

凤头麦鸡
Vanellus vanellus

【英文名】Northern Lapwing
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅、冬（1、10 ～ 12）。状况：易见。

LC : 34 ~ 38 cm

灰头麦鸡
Vanellus cinereus

【英文名】Grey-headed Lapwing
【国内分布状况】见于新疆、西藏除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（2～4、8）。状况：少见。

LC : 23 ~ 26 cm

金斑鸻
Pluvialis fulva

【英文名】Pacific Golden Plover
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、9）。状况：少见。

LC : 27 ~ 31 cm

灰斑鸻
Pluvialis squatarola

【英文名】Grey Plover
【国内分布状况】见于青藏高原除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、10）。状况：少见。

LC : 19 ~ 21 cm

长嘴剑鸻
Charadrius placidus

【英文名】Long-billed Plover
【国内分布状况】见于新疆除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、8 ～ 12）。状况：常见。

LC : 14 ~ 17 cm

金眶鸻
Charadrius dubius

【英文名】Little Ringed Plover
【国内分布状况】广泛分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅、冬（1、2、9～12）。状况：易见。

繁殖羽

非繁殖羽

LC : 15 ~ 17 cm

环颈鸻
Charadrius alexandrinus

【英文名】Kentish Plover
【国内分布状况】广泛分布于青藏高原除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（3、4、10）。状况：易见。

繁殖羽

非繁殖羽

彩鹬科
Rostratulidae

LC : 23 ~ 28 cm

彩鹬
Rostratula benghalensis

【英文名】Greater Painted Snipe

【国内分布状况】繁殖于北至环渤海地区、西至四川盆地的北方地区，在长江以南为留鸟。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

雄鸟

雄鸟

雌鸟

水雉科
Jacanidae

LC : 38 ~ 58 cm

水雉
Hydrophasianus chirurgus

II

【英文名】Pheasant-tailed Jacana
【国内分布状况】分布于华北、华中、华南、华东、西南等地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5、9、11）。状况：少见。

丘鹬科 Scolopacidae

LC : 40 ~ 46 cm

中杓鹬
Numenius phaeopus

【英文名】
Eurasian Whimbrel
【国内分布状况】
迁徙时见于我国东部大部分地区，尤其是沿海地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

2020 年 10 月 13 日肖力在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽记录

NT : 57 ~ 63 cm

白腰杓鹬
Numenius arquata

【英文名】Eurasian Curlew
【国内分布状况】繁殖于华北、东北，迁徙经过我国大部分地区，越冬于长江以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、10）。状况：罕见。

II

参见唐兆和、唐庆圆、苏德政著《武夷山风景名胜区鸟类资源调查报告》

NT : 35 ~ 42 cm

黑尾塍鹬
Limosa limosa

【英文名】Black-tailed Godwit
【国内分布状况】见于西藏除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5、11）。状况：少见。

繁殖羽

非繁殖羽（陈存恩 摄）

进入繁殖羽

LC : 55 ~ 63 cm ♂
45 ~ 50 cm ♀

流苏鹬
Calidris pugnax

【英文名】
Ruff
【国内分布状况】
迁徙时经过新疆北部、青藏高原至西藏南部、东北东部经渤海、黄海至东海的沿海地区，包括台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（3）。状况：罕见。

非繁殖羽

2014 年 3 月 10 日杨林等在武夷山国家公园南源岭农田有单羽记录

LC : 15 ~ 23 cm

尖尾滨鹬
Calidris acuminata

【英文名】Sharp-tailed Sandpiper
【国内分布状况】迁徙经中部和东部大部分地区，少量越冬于台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5）。状况：少见。

NT : 19 ~ 23 cm

弯嘴滨鹬
Calidris ferruginea

【英文名】Curlew Sandpiper
【国内分布状况】迁徙季节经过中国东部和西部地区，部分越冬于广东、海南和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型：旅（4、8）。状况：罕见。

2018 年 8 月 28 日和 2021 年 4 月 10 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段分别有单羽记录

LC : 13 ~ 15 cm

青脚滨鹬
Calidris temminckii

【英文名】Temminck's Stint
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、9）。状况：少见。

非繁殖羽

繁殖羽

非繁殖羽

LC : 13 ~ 16 cm

长趾滨鹬
Calidris subminuta

【英文名】
Long-toed Stint
【国内分布状况】
迁徙经过我国大部分地区，越冬于华南沿海及台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、5）。状况：少见。


繁殖羽

NT : 13 ~ 16 cm

红颈滨鹬
Calidris ruficollis

【英文名】Red-necked Stint
【国内分布状况】迁徙经过我国东部、中部地区，越冬于东南、华南沿海地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4）。状况：少见。

繁殖羽

非繁殖羽

非繁殖羽

LC : 16 ~ 22 cm

黑腹滨鹬
Calidris alpina

【英文名】
Dunlin
【国内分布状况】
迁徙时经过西北、东北及东部沿海地区，广泛越冬于长江中下游及其以南的沿海地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（2、3、11、12）。状况：易见。

繁殖羽

NT : 33 ~ 36 cm

II

半蹼鹬
Limnodromus semipalmatus

【英文名】Asian Dowitcher
【国内分布状况】繁殖于东北和内蒙古，迁徙经新疆、青海及我国东部地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

繁殖羽

非繁殖羽

2020 年 4 月 24 日～ 29 日陈存恩在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽记录

LC : 33 ~ 38 cm

丘鹬
Scolopax rusticola

【英文名】
Eurasian Woodcock
【国内分布状况】
见于全国各地，越冬于长江以南地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：居留情况不明。状况：罕见。

2013 年 10 月 27 日和 2017 年 3 月 25 日在武夷山国家公园景区有两笔单羽记录

LC : 25 ~ 27 cm

针尾沙锥
Gallinago stenura

【英文名】Pin-tailed Snipe
【国内分布状况】迁徙经我国大部分地区，越冬于华南、西南，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、8、9）。状况：少见。

左为针尾沙锥，右为扇尾沙锥

LC : 24 ~ 29 cm

扇尾沙锥
Gallinago gallinago

【英文名】
Common Snipe
【国内分布状况】
繁殖于新疆和东北，越冬于黄河以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、9 ～ 12）。
状况：常见。

左为扇尾沙锥，右为针尾沙锥

LC : 27 ~ 31 cm

大沙锥
Gallinago megala

【英文名】Swinhoe's Snipe
【国内分布状况】迁徙经新疆及中东部大部分地区，越冬于华南，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（8、9）。状况：罕见。

前两只为扇尾沙锥，后为大沙锥

左为针尾沙锥，右为大沙锥

LC : 16 ~ 20 cm

红颈瓣蹼鹬
Phalaropus lobatus

【英文名】Red-necked Phalarope
【国内分布状况】迁徙经过东北、华东、华南、西北、西南地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

2013 年 10 月 7 日在武夷山国家公园景区水潭中有单羽记录

LC : 16 ~ 22 cm

矶鹬
Actitis hypoleucos

【英文名】
Common Sandpiper
【国内分布状况】
繁殖于北方各地，越冬于长江流域及其以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、9 ～ 12）。状况：常见。

LC : 21 ~ 25 cm

白腰草鹬
Tringa ochropus

【英文名】Green Sandpiper
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～4、9～12）。状况：常见。

NT : 23 ~ 28 cm

灰尾漂鹬
Tringa brevipes

【英文名】Grey-tailed Tattler
【国内分布状况】迁徙经东北、华北、华东、华南等地，越冬于海南和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、8）。状况：罕见。

2015 年 4 月 25 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽记录

繁殖羽

LC : 26 ~ 29 cm

红脚鹬
Tringa totanus

【英文名】
Common Redshank
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

左为亚成鸟、右为成鸟

2015 年 4 月 12 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽记录

LC : 22 ~ 25 cm

泽鹬
Tringa stagnatilis

【英文名】
Marsh Sandpiper
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：
旅（4）。状况：少见。

LC : 19 ~ 23 cm

林鹬
Tringa glareola

【英文名】Wood Sandpiper
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅、冬（1～4、9～12）。状况：常见。

LC : 30 ~ 35 cm

青脚鹬
Tringa nebularia

【英文名】Common Greenshank
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～4、9～12）。状况：常见。

LC : 26 ~ 33 cm

鹤鹬
Tringa erythropus

【英文名】Spotted Redshank
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（2～4、11）。状况：少见。

繁殖羽

非繁殖羽

燕鸻科 Glareolidae

LC : 24 ~ 28 cm

普通燕鸻
Glareola maldivarum

【英文名】Oriental Pratincole
【国内分布状况】繁殖于我国东北至中东部大部分地区，迁徙经西南和华南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、6）。状况：罕见。

2015 年 4 月 18 日、2019 年 6 月 22 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段分别有单羽记录

鸥科
Laridae

LC : 36 ~ 42 cm

红嘴鸥
Chroicocephalus ridibundus

【英文名】Black-headed Gull
【国内分布状况】常见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（1、2、4、11、12）。状况：常见。

LC : 46 ~ 48 cm

黑尾鸥
Larus crassirostris

【英文名】Black-tailed Gull
【国内分布状况】东部和南部沿海地区均有分布。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（12）。状况：罕见。

2019 年 12 月 19 日谢少和在武夷山国家公园邵武市区域有单羽记录

2020 年 4 月 30 日衷伯夷、陈存恩在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有单羽记录

LC : 35 ~ 38 cm

鸥嘴噪鸥
Gelochelidon nilotica

【英文名】
Gull-billed Tern
【国内分布状况】
见于东北、华中、东南、华南以及新疆。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

LC : 31 ~ 38 cm

普通燕鸥
Sterna hirundo

【英文名】Common Tern
【国内分布状况】常见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5、9）。状况：罕见。

2018 年 9 月 24 日和 2019 年 5 月 26 日衷伯夷、陈存恩在武夷山国家公园景区崇阳溪河段分别有单羽记录

LC : 20 ~ 28 cm

白额燕鸥
Sternula albifrons

【英文名】
Little Tern
【国内分布状况】
见于西藏除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、5）。状况：少见。

LC : 23 ~ 28 cm

须浮鸥
Chlidonias hybrida

【英文名】
Whiskered Tern
【国内分布状况】
常见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（3～5、9）。状况：易见。

LC : 20 ~ 25 cm

白翅浮鸥
Chlidonias leucopterus

【英文名】White-winged Tern
【国内分布状况】常见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（5、7、8）。状况：易见。

繁殖羽

非繁殖羽

鸽形目 COLUMBIFORMES

中小型林栖性陆禽。形态似家鸽，体羽以蓝灰色、褐色、白色或绿色为主。喙短且钝，两翼多长而尖，善飞行，脚短而强健，善于在地面和树干行走。多数栖息于森林。主要以植物嫩芽、种子、果实和嫩叶以及小型无脊椎动物为食。中国有 1 科 8 属 33 种，武夷山国家公园有 1 科 4 属 5 种。

鸠鸽科 Columbidae

LC : 30 ~ 36 cm

山斑鸠
Streptopelia orientalis

【英文名】
Oriental Turtle Dove
【国内分布状况】
分布于青藏高原除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：常见。

LC : 23 ~ 26 cm

火斑鸠
Streptopelia tranquebarica

【英文名】
Red Collared Dove
【国内分布状况】
繁殖于辽宁、河北以南的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（7）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

标本采集于武夷山国家公园邵武市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆，
2017 年 7 月 1 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 28 ~ 32 cm

珠颈斑鸠
Spilopelia chinensis

【英文名】Spotted Dove
【国内分布状况】分布于华东、华南、华北和中西部的绝大多数地区，包括台湾和海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留 。状况：常见。

LC : 33 ~ 40 cm

斑尾鹃鸠
Macropygia unchall

II

【英文名】
Barred Cuckoo-Dove

【国内分布状况】
分布于华东、华南、西南山地及西藏东南部。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 21 ~ 33 cm

红翅绿鸠
Treron sieboldii

II

【英文名】White-bellied Green Pigeon
【国内分布状况】分布于华北、华东、西南、华南，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（1）。状况：罕见。

标本采集于武夷山国家公园邵武市、武夷山市区域，现分别藏于福建师范大学动物标本馆和武汉大学动物标本馆

鹃形目 CUCULIFORMES

中型攀禽。体型瘦长，雌雄大多同色，羽色多样。喙较长而略下弯。大多两翼尖长，飞行姿态似猛禽；脚短，对趾型。尾长。多单独栖息于森林、荒漠、芦苇丛。叫声洪亮且独特。绝大多数种类具巢寄生习性，主要以毛虫和其他昆虫为食。多数种类具迁徙习性。中国有 1 科 9 属 20 种，武夷山国家公园有 1 科 6 属 11 种。

杜鹃科 Cuculidae

LC : 45 ~ 55 cm

褐翅鸦鹃
Centropus sinensis

II

【英文名】Greater Coucal
【国内分布状况】分布于长江流域及其以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 34 ~ 38 cm

小鸦鹃
Centropus bengalensis

II

【英文名】
Lesser Coucal

【国内分布状况】
分布于长江流域及其以南各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 38 ~ 46 cm

红翅凤头鹃
Clamator coromandus

【英文名】
Chestnut-winged Cuckoo

【国内分布状况】
繁殖于华东、华中、西南、华南，包括海南。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（3～6）。状况：少见。

LC : 38 ~ 45 cm

噪鹃
Eudynamys scolopaceus

【英文名】
Asian Koel

【国内分布状况】
分布于华东、华中、西南、华南。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（3～7）。状况：易见。

LC : 21 ~ 25 cm

八声杜鹃
Cacomantis merulinus

【英文名】
Plaintive Cuckoo
【国内分布状况】
见于西南、华东、华南，包括海南、台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～10）。状况：易见。

2015 年 5 月 1 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 24 ~ 28 cm

乌鹃
Surniculus lugubris

【英文名】
Square-tailed Drongo-Cuckoo
【国内分布状况】
见于西南、华中、华东、华南，包括海南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（5～7）。状况：罕见。

LC : 38 ~ 42 cm

鹰鹃
Hierococcyx sparverioides

【英文名】
Large Hawk-Cuckoo
【国内分布状况】
全国各地均有分布（东北以及新疆、青海除外）。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～10）。状况：常见。

LC : 24 ~ 26 cm

小杜鹃
Cuculus poliocephalus

【英文名】
Asian Lesser Cuckoo
【国内分布状况】
见于新疆、宁夏除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：少见。

LC : 31 ~ 34 cm

四声杜鹃
Cuculus micropterus

【英文名】
Indian Cuckoo
【国内分布状况】
见于新疆除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4、5）。状况：少见。

LC : 25 ~ 34 cm

中杜鹃
Cuculus saturatus

【英文名】
Himalayan Cuckoo
【国内分布状况】
华北、华东、华中、西南、华南均有分布。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（5～8）。状况：少见。

LC : 32 ~ 38 cm

大杜鹃
Cuculus canorus

【英文名】Common Cuckoo
【国内分布状况】全国均有分布。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（7～9）。状况：少见。

鸮形目 STRIGIFORMES

行为独特的夜行性猛禽，俗称猫头鹰。雌雄同色，体羽多以褐色、灰色和棕色为主，体态圆胖且健壮；大多具面盘，部分种类具耳羽簇，双眼向前，圆而大。绝大多数为夜行性，主要靠视觉和听觉捕食。 主要以鼠类、鸟类和其他小型动物为食。少数种类具迁徙习性。中国有 2 科 12 属 32 种，武夷山国家公园有 2 科 6 属 11 种。

仓鸮科 Tytonidae

LC : 32 ~ 38 cm

草鸮
Tyto longimembris

II

【英文名】
Eastern Grass Owl
【国内分布状况】
分布于云南至湖北至山东以东的大部分地区，包括台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：罕见。

鸱鸮科 Strigidae

LC : 23 ~ 25 cm

领角鸮
Otus lettia

II

【英文名】
Collared Scops Owl
【国内分布状况】
分布于长江以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：易见。

LC : 18 ~ 20 cm

黄嘴角鸮
Otus spilocephalus

II

【英文名】
Mountain Scops Owl
【国内分布状况】
见于云南、广西、海南、广东、福建、江西、浙江和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：罕见。

LC : 15 ~ 22 cm

红角鸮
Otus sunia

II

【英文名】
Oriental Scops Owl
【国内分布状况】
主要分布于东部各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 59 ~ 73 cm

雕鸮
Bubo bubo

II

【英文名】
Eurasian Eagle-Owl
【国内分布状况】
广泛分布于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：罕见。

LC : 39 ~ 55 cm

褐林鸮
Strix leptogrammica

II

【英文名】
Brown Wood Owl
【国内分布状况】
分布于长江以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 26 ~ 31 cm

北鹰鸮
Ninox japonica

II

【英文名】
Northern Boobook
【国内分布状况】
分布于东北、华北、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～7）。状况：少见。

LC : 15 ~ 18 cm

领鸺鹠
Glaucidium brodiei

II

【英文名】
Collared Owlet
【国内分布状况】
分布于秦岭—淮河以南大部分地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 22 ~ 25 cm

斑头鸺鹠
Glaucidium cuculoides

II

【英文名】
Asian Barred Owlet
【国内分布状况】
主要分布于西南、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

2014 年 12 月 21 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 33 ~ 40 cm

长耳鸮
Asio otus

II

【英文名】
Long-eared Owl
【国内分布状况】
见于青藏高原和海南除外的全国大多数地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1、12）。状况：罕见。

2015 年 1 月 25 日和 2017 年 12 月 23 日在武夷山国家公园景区分别有一笔单羽记录

LC : 35 ~ 40 cm

短耳鸮
Asio flammeus

II

【英文名】
Short-eared Owl
【国内分布状况】
见于青藏高原和海南除外的全国大多数地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1、12）。状况：罕见。

夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES

体态似鹰的中小型夜行性攀禽。头较扁平，喙极短小，有发达的喙须或特化成须状的羽毛。雌雄同色。两翼尖长或短圆，飞行时安静无声。主要栖息于森林，也见于开阔生境。夜行性，多以昆虫为食，少数种类以植物果实为主。中国有 2 科 3 属 7 种，武夷山国家公园有 1 科 1 属 1 种。

夜鹰科 Caprimulgidae

LC : 24 ~ 29 cm

普通夜鹰
Caprimulgus jotaka

【英文名】Grey Nightjar
【国内分布状况】从东北到西南以东大部分地区均有分布。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（4 ～ 10）。状况：易见。

雨燕目 APODIFORMES

小型林栖性攀禽，包括雨燕和蜂鸟。喙短弱或细长。雌雄同色或差异较小，雨燕羽色较暗淡。雨燕等主要以昆虫为食。中国有 2 科 6 属 15 种，武夷山国家公园有 1 科 2 属 3 种。

雨燕科 Apodidae

LC : 19 ~ 21 cm

白喉针尾雨燕
Hirundapus caudacutus

【英文名】
White-throated Needletail
【国内分布状况】
见于东北、华北、华中、东南、西南、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、10）。状况：易见。

2019 年 5 月 11 日在黄岗山雨燕崖壁观察到一对白腰雨燕营巢

LC : 17 ~ 20 cm

白腰雨燕
Apus pacificus

【英文名】
Pacific Swift
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、5、10）。状况：易见。

LC : 11 ~ 15 cm

小白腰雨燕
Apus nipalensis

【英文名】House Swift
【国内分布状况】见于长江流域及其以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留、夏。状况：常见。

咬鹃目 TROGONIFORMES

体色艳丽的中型树栖性鸟类。喙粗短且尖，端略有钩，具发达的喙须。雌雄异色。主要栖息于郁密的阔叶森林。主要以昆虫、两栖爬行类和软体动物为食，也吃植物果实。均为留鸟，见于亚热带和热带森林。中国有 1 科 1 属 3 种，武夷山国家公园有 1 科 1 属 1 种。

雄鸟

咬鹃科 Trogonidae

LC : 35 ~ 40 cm

红头咬鹃
Harpactes erythrocephalus

II

【英文名】
Red-headed Trogon
【国内分布状况】
分布于西南、东南、华南地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

雌鸟

佛法僧目 CORACIIFORMES

体色艳丽的树栖性中小型攀禽。喙长且有力，头大而颈短，两翼多宽长。雌雄大多同色，或略有区别。脚短，并趾型。尾多为平尾或圆尾。多栖息于河流、湖泊、森林、原野等生境。主要以鱼虾、两栖爬行类、昆虫以及植物果实和种子为食。中国有 3 科 11 属 23 种，武夷山国家公园有 3 科 6 属 8 种。

佛法僧科 Coraciidae

LC : 26 ~ 32 cm

三宝鸟
Eurystomus orientalis

【英文名】
Oriental Dollarbird
【国内分布状况】
见于新疆、青海、西藏除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：易见。

翠鸟科 Alcedinidae

LC : 26 ~ 30 cm

白胸翡翠
Halcyon smyrnensis

II

【英文名】
White-throated Kingfisher
【国内分布状况】
主要分布于长江以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 26 ~ 31 cm

蓝翡翠
Halcyon pileata

【英文名】
Black-capped Kingfisher

【国内分布状况】
分布于东北至西南以东各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：罕见。

2012 年 7 月、2014 年 7 月～ 9 月在武夷山国家公园景区黄柏溪河段分别有一对记录

LC : 15 ~ 17 cm

普通翠鸟
Alcedo atthis

【英文名】
Blue-eared Kingfisher

【国内分布状况】
分布于全国各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

NT : 22 ~ 23 cm

斑头大翠鸟
Alcedo hercules

II

【英文名】
Blyth's Kingfisher
【国内分布状况】
主要分布于福建和江西。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：罕见。

参见唐兆和、唐庆圆、苏德政著《武夷山风景名胜区鸟类资源调查报告》

LC : 37 ~ 42 cm

冠鱼狗
Megaceryle lugubris

【英文名】Crested Kingfisher
【国内分布状况】广泛分布于我国华北、华中、西南、东南和华南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 27 ~ 32 cm

斑鱼狗
Ceryle rudis

【英文名】Pied Kingfisher
【国内分布状况】主要分布于长江以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

蜂虎科 Meropidae

LC : 21 ~ 32 cm

蓝喉蜂虎
Merops viridis

II

【英文名】
Blue-throated Bee-eater
【国内分布状况】
见于河南、云南、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南和香港。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（5～8）。状况：常见。

犀鸟目 BUCEROTIFORMES

大中型攀禽。雌雄大多同色。喙长而弯，具发达的羽冠或盔突。脚强健，尾长。多以植物果实特别是榕果为食，也吃植物嫩芽、两栖爬行类、小型鸟类和哺乳动物。大多数为留鸟，少数具迁徙习性。中国有 2 科 6 属 6 种，武夷山国家公园有 1 科 1 属 1 种。

戴胜科 Upupidae

LC : 25 ~ 31 cm

戴胜
Upupa epops

【英文名】Common Hoopoe
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。

䴕形目 PICIFORMES

林栖性中小型攀禽，最大的攀禽类群。喙大多呈锥状，坚实有力。雌雄多为同色或羽色差异较小。脚短而强健，对趾型，善攀爬。主要栖息于温带至热带森林，营巢于树洞。主要以昆虫、植物种子和果实为食，少数种类具迁徙习性。中国有 3 科 19 属 43 种，武夷山国家公园有 2 科 9 属 13 种。

拟啄木鸟科 Megalaimidae

LC : 30 ~ 35 cm

大拟啄木鸟
Psilopogon virens

【英文名】
Great Barbet
【国内分布状况】
分布于海南和台湾除外的南方各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：易见。

LC : 20 ~ 22 cm

黑眉拟啄木鸟
Psilopogon faber

【英文名】
Chinese Barbet
【国内分布状况】
主要分布于东南、华南、西南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

啄木鸟科 Picidae

LC : 16 ~ 19 cm

蚁䴕
Jynx torquilla

【英文名】
Eurasian Wryneck
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1～3、10～12）。状况：易见。

LC : 9 ~ 10 cm

斑姬啄木鸟
Picumnus innominatus

【英文名】
Speckled Piculet
【国内分布状况】
主要分布于我国南方各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 14 ~ 17 cm

星头啄木鸟
Yungipicus canicapillus

【英文名】Grey-capped Pygmy Woodpecker
【国内分布状况】主要分布于我国东部、中部、西南、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 20 ~ 26 cm

大斑啄木鸟
Dendrocopos major

【英文名】Great Spotted Woodpecker
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。





LC : 25 ~ 30 cm

白背啄木鸟
Dendrocopos leucotos

【英文名】
White-backed Woodpecker

【国内分布状况】
分布于东北、华北以及新疆北部、陕西、四川、重庆、福建西北部、江西东北部、台湾。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

雄鸟

雌鸟

雄鸟

LC : 31 ~ 36 cm

大黄冠啄木鸟
Chrysophlegma flavinucha

II

【英文名】
Greater Yellownape

【国内分布状况】
分布于西藏、云南、四川、江西、福建、广西和海南。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（5、8）。状况：罕见。

雌鸟

LC : 25 ~ 29 cm

黄冠啄木鸟
Picus chlorolophus

II

【英文名】
Lesser Yellownape
【国内分布状况】
分布于西藏、云南、江西、福建和海南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 23 ~ 25 cm

竹啄木鸟
Gecinulus grantia

【英文名】Pale-headed Woodpecker
【国内分布状况】分布于云南、江西、福建以及广东。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。
模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 26 ~ 31 cm

灰头绿啄木鸟
Picus canus

【英文名】
Grey-headed Woodpecker
【国内分布状况】
广泛分布于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 25 ~ 32 cm

黄嘴栗啄木鸟
Blythipicus pyrrhotis

【英文名】Bay Woodpecker
【国内分布状况】分布于云南、四川、重庆、贵州、广西、湖南、福建和海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。
模式标本产地：武夷山国家公园

雄鸟

雌鸟

雄鸟

LC : 23 ~ 28 cm

栗啄木鸟
Micropternus brachyurus

【英文名】
Rufous Woodpecker
【国内分布状况】
分布于云南、广西、广东、江西、浙江、湖南、福建和海南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

雌鸟

隼形目 FALCONIFORMES

中小型日行性猛禽。喙短而强壮带钩，上喙具单齿突，蜡膜明显。身体呈锥状，两翼尖长，尾较长，为圆尾或楔尾。大多雌雄同色或羽色有细微差异，体羽多以黑色、白色、灰色和红棕色为主。栖息于林缘和开阔生境，飞行迅速有力，以昆虫、鸟类和啮齿动物为食。部分种类具迁徙习性。全国广布。中国有 1 科 2 属 12 种，武夷山国家公园有 1 科 2 属 5 种。

隼科 Falconidae

LC : 15 ~ 15 cm

白腿小隼
Microhierax melanoleucos

II

【英文名】
Pied Falconet
【国内分布状况】
主要分布于我国南方各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

武夷山国家公园建阳区区域发现长年繁殖种群

雌鸟

LC : 31 ~ 38 cm

红隼
Falco tinnunculus

II

【英文名】
Common Kestrel
【国内分布状况】
分布于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留、冬。状况：易见。

雄鸟

雄鸟

LC : 29 ~ 35 cm

II

燕隼
Falco subbuteo

【英文名】Eurasian Hobby
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 41 ~ 50 cm

II

游隼
Falco peregrinus

【英文名】Peregrine Falcon
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留、冬。状况：易见。

LC : 25 ~ 30 cm

红脚隼
Falco amurensis

II

【英文名】Amur Falcon
【国内分布状况】见于新疆和青藏高原除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

上为雌鸟，下为雄鸟

2018 年 10 月 20 日在武夷山国家公园景区崇阳溪河段有约 300 羽规模迁徙记录

雀形目 PASSERIFORMES

鸟类中最为庞杂的一目，为中小型鸣禽，喙形多样。离趾型足，趾三前一后，后趾与中趾等长；腿细弱，跗跖后缘鳞片常愈合为整块鳞板；雀腭型头骨。主要栖息于森林、草原、农田、荒漠、公园和居民区等生境中。雀形目占鸟类全部种类的一半以上。中国有 100 科 5400 余种，武夷山国家公园有 42 科 103 属 204 种。

钩嘴鵙科 Vangidae

LC : 18 ~ 23 cm

钩嘴林鵙
Tephrodornis virgatus

【英文名】Large Woodshrike
【国内分布状况】分布于云南、贵州、广西、广东、江西、福建、浙江和海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

雄鸟

雌鸟

幼鸟

燕鵙科 Artamidae

LC : 16 ~ 19 cm

灰燕鵙
Artamus fuscus

【英文名】
Ashy Woodswallow
【国内分布状况】
分布于云南、贵州、广西、广东及海南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：迷（6）。状况：罕见。

2014 年 6 月 28 日在武夷山国家公园景区农田有二羽记录，为福建鸟类新记录

鵑鵙科 Campephagidae

LC : 18 ~ 22 cm

灰山椒鸟
Pericrocotus divaricatus

【英文名】
Ashy Minivet
【国内分布状况】
繁殖于东北地区，迁徙时经陕西南部至四川中部以东的广大地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（9）。状况：少见。

LC : 17 ~ 19 cm

灰喉山椒鸟
Pericrocotus solaris

【英文名】Grey-chinned Minivet
【国内分布状况】分布于西南、长江以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

LC : 17 ~ 22 cm

赤红山椒鸟
Pericrocotus speciosus

【英文名】Scarlet Minivet
【国内分布状况】分布于西南、华南、东南，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

LC : 18 ~ 19 cm

小灰山椒鸟
Pericrocotus cantonensis

【英文名】Swinhoe's Minivet
【国内分布状况】见于河南南部至甘肃东南部以南、四川中部以东的地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：易见。

雄鸟

雌鸟

LC : 29 ~ 33 cm

大鹃鹛
Coracina macei

【英文名】
Large Cuckooshrike
【国内分布状况】
分布于云南、贵州、浙江、福建、广东、海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 20 ~ 25 cm

暗灰鹃鸫
Lalage melaschistos

【英文名】
Black-winged Cuckooshrike

【国内分布状况】
分布于西北、华北、华东、华中、华南、西南，包括海南和台湾。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：少见。

伯劳科 Laniidae

LC : 17 ~ 19 cm

虎纹伯劳
Lanius tigrinus

【英文名】Tiger Shrike

【国内分布状况】见于东北至华中、华东及西南各地。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（5）。状况：罕见。

雄鸟

2016 年 5 月 10 日和 2017 年 5 月 26 日在武夷山国家公园景区各有二羽记录

雄鸟

雌鸟

LC : 16 ~ 18 cm

牛头伯劳
Lanius bucephalus

【英文名】
Bull-headed Shrike
【国内分布状况】
见于东北、华北、华中、华东、华南以及甘肃、陕西、四川等地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1～2、12）。状况：少见。

LC : 20 ~ 25 cm

棕背伯劳
Lanius schach

【英文名】Long-tailed Shrike
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

普通型

深色型

深色型（白化现象）

LC : 17 ~ 20 cm

红尾伯劳
Lanius cristatus

【英文名】
Brown Shrike
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。
状况：易见。

LC : 25 ~ 27 cm

楔尾伯劳
Lanius sphenocercus

【英文名】Chinese Grey Shrike
【国内分布状况】见于新疆除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（3）。状况：罕见。

2014 年 3 月 22 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

莺雀科 Vireonidae

LC : 11 ~ 13 cm

白腹凤鹛
Erpornis zantholeuca

【英文名】White-bellied Erpornis
【国内分布状况】分布于西南、华南、东南，包括台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 14 ~ 15 cm

红翅鹎鹛
Pteruthius aeralatus

【英文名】Blyth's Shrike Babbler
【国内分布状况】分布于西南、东南、华南，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

P. a. ricketti 雄鸟

P. a. ricketti 雌鸟

P. x. pallidus 亚种

LC : 12 ~ 13 cm

淡绿鹎鹛
Pteruthius xanthochlorus

【英文名】
Green Shrike Babbler
【国内分布状况】
分布于华中、西南、华南及东南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：罕见。

模式标本产地：武夷山国家公园

P. x. pallidus 亚种

黄鹂科 Oriolidae

LC : 23 ~ 28 cm

黑枕黄鹂
Oriolus chinensis

【英文名】Black-naped Oriole
【国内分布状况】见于西藏、新疆、青海、甘肃除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（5、6）。状况：罕见。

亚成鸟

2020 年 5 月～6 月在武夷山国家公园景区有二羽记录

卷尾科 Dicruridae

LC : 29 ~ 34 cm

发冠卷尾
Dicrurus hottentottus

【英文名】
Hair-crested Drongo
【国内分布状况】
分布于华北、华中、华东、华南和西南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（5～9）。状况：易见。

LC : 26 ~ 28 cm

灰卷尾
Dicrurus leucophaeus

【英文名】
Ashy Drongo
【国内分布状况】
分布于秦岭—淮河以南和以东各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（5、6）。状况：少见。

LC : 24 ~ 30 cm

黑卷尾
Dicrurus macrocercus

【英文名】
Black Drongo
【国内分布状况】
分布于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（3～9）。状况：常见。

王鹟科 Monarchidae

LC : 20 ~ 42 cm

寿带
Terpsiphone incei

【英文名】
Amur Paradise Flycatcher

【国内分布状况】
见于内蒙古、青海、新疆、西藏除外的全国各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅、 夏（7 ～ 9）。
状况：少见。

雄鸟

雌鸟

鸦科 Corvidae

LC : 30 ~ 35 cm

松鸦
Garrulus glandarius

【英文名】
Eurasian Jay

【国内分布状况】
分布于青藏高原、海南除外的全国各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 50 ~ 60 cm

红嘴蓝鹊
Urocissa erythroryncha

【英文名】Red-billed Blue Magpie
【国内分布状况】分布于北至辽宁、西至宁夏的北方地区，以及长江以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 35 ~ 40 cm

灰树鹊
Dendrocitta formosae

【英文名】Grey Treepie
【国内分布状况】分布于西南、华东、华南，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 40 ~ 50 cm

喜鹊
Pica serica

【英文名】
Oriental Magpie
【国内分布状况】
分布于东北、华北、华东、华中、西南、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：罕见。

标本采集于武夷山国家公园武夷山市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆

标本采集于武夷山国家公园武夷山市区域，现标本去向不明

VU : 44 ~ 55 cm

白颈鸦
Corvus torquatus

【英文名】
Collared Crow
【国内分布状况】
主要分布于长江以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：罕见。

LC : 45 ~ 57 cm

大嘴乌鸦
Corvus macrorhynchos

【英文名】Large-billed Crow
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：罕见。

标本采集于武夷山国家公园邵武市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆

仙莺科 Stenostiridae

LC : 12 ~ 14 cm

方尾鹟
Culicicapa ceylonensis

【英文名】
Grey-headed Canary Flycatcher
【国内分布状况】
分布于中南、西南、东南、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：居留状况暂不明确。
状况：罕见。

2018 年 9 月 9 日在武夷山国家公园桐木段有单羽记录

山雀科 Paridae

LC : 9 ~ 10 cm

黄眉林雀
Sylviparus modestus

【英文名】
Yellow-browed Tit
【国内分布状况】
分布于西南、华南和东南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 20 ~ 21 cm

冕雀
Melanochlora sultanea

【英文名】
Sultan Tit
【国内分布状况】
分布于西南、东南、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 9 ~ 12 cm

煤山雀
Periparus ater

【英文名】Coal Tit
【国内分布状况】分布于华南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。
模式标本产地：武夷山国家公园

P. a. kuatunensis 亚种

NR : 12 ~ 14 cm

远东山雀
Parus minor

【英文名】Japanese Tit
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 9 ~ 11 cm

黄腹山雀
Pardaliparus venustulus

【英文名】Yellow-bellied Tit
【国内分布状况】分布于西北地区除外的全国大部分地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

雄鸟

雌鸟

LC : 13 ~ 16 cm

黄颊山雀
Machlolophus spilonotus

【英文名】Yellow-cheeked Tit
【国内分布状况】分布于西南、华南和东南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。
模式标本产地：武夷山国家公园

雄鸟

雌鸟

雄鸟

攀雀科 Remizidae

LC : 10 ~ 11 cm

中华攀雀
Remiz consobrinus

【英文名】
Chinese Penduline Tit
【国内分布状况】
主要见于我国东部各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、11、12）。
状况：易见。

雌鸟

百灵科 Alaudidae

LC : 14 ~ 16 cm

小云雀
Alauda gulgula

【英文名】Oriental Skylark
【国内分布状况】分布于西南、华中、华东、华南以及青藏高原。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

（裘柏夷 摄）

鹎科 Pycnonotidae

LC : 19 ~ 23 cm

栗背短脚鹎
Hemixos castanonotus

【英文名】
Chestnut Bulbul
【国内分布状况】
分布于西南、华中、华南、华东各地，包括海南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 21 ~ 24 cm

绿翅短脚鹎
Ixos mcclellandii

【英文名】
Mountain Bulbul
【国内分布状况】
分布于黄河以南、西南以东各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 22 ~ 26 cm

黑短脚鹎
Hypsipetes leucocephalus

【英文名】Black Bulbul
【国内分布状况】分布于西南、华中、华南、华东各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

无白头型

白头型

LC : 19 ~ 23 cm

白喉红臀鹎
Pycnonotus aurigaster

【英文名】Sooty-headed Bulbul
【国内分布状况】分布于西南、华南、东南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 18 ~ 22 cm

白头鹎
Pycnonotus sinensis

【英文名】
Light-vented Bulbul
【国内分布状况】
广布于西南、华南、华东、华中、华北各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 21 ~ 23 cm

领雀嘴鹎
Spizixos semitorques

【英文名】
Collared Finchbill
【国内分布状况】
分布于华北、华中、西南、华东、华南各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。



燕科 Hirundinidae

LC : 12 ~ 13 cm

淡色沙燕
Riparia diluta

【英文名】
Pale Martin
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。



LC : 17 ~ 19 cm

家燕
Hirundo rustica

【英文名】Barn Swallow
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（3 ～ 10）。状况：常见。



LC : 11 ~ 14 cm

烟腹毛脚燕
Delichon dasypus

【英文名】Asian House Martin
【国内分布状况】见于新疆除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。
模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 16 ~ 20 cm

金腰燕
Cecropis daurica

【英文名】Red-rumped Swallow
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（4 ～ 10）。状况：常见。

鳞胸鹪鹛科
Pnoepygidae

LC : 8 ~ 9 cm

小鳞胸鹪鹛
Pnoepyga pusilla

【英文名】Pygmy Cupwing
【国内分布状况】分布于四川、贵州、云南、陕西、安徽、江西、广东和福建。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

成鸟

亚成鸟

树莺科
Cettiidae

LC : 8 ~ 9 cm

棕脸鹟莺
Abroscopus albogularis

【英文名】Rufous-faced Warbler
【国内分布状况】分布于西南、甘肃、陕西、长江流域及其以南各地，包括台湾和香港。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 15 ~ 18 cm

远东树莺
Horornis canturians

【英文名】
Manchurian Bush Warbler
【国内分布状况】
见于东北、华北、华中、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（3）。状况：少见。

LC : 11 ~ 12 cm

强脚树莺
Horornis fortipes

【英文名】
Brownish-flanked Bush Warbler

【国内分布状况】
分布于北京、河北、陕西、甘肃以南以及华中、华南、西南各地，包括台湾。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 10 ~ 11 cm

黄腹树莺
Horornis acanthizoides

【英文名】
Yellowish-bellied Bush Warbler

【国内分布状况】
分布于陕西、甘肃南部直至华中、华东、西南、华南的中、高海拔山地以及台湾。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 9 ~ 11 cm

鳞头树莺
Urosphena squameiceps

【英文名】Asian Stubtail

【国内分布状况】繁殖于东部和华北，迁徙见于我国沿海大部分地区，包括海南和台湾。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

2015 年 4 月 12 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

长尾山雀科 Aegithalidae

LC : 9 ~ 12 cm

红头长尾山雀
Aegithalos concinnus

【英文名】Black-throated Bushtit

【国内分布状况】分布于秦岭—淮河以南各地。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

柳莺科 Phylloscopidae

LC : 10 ~ 11 cm

黄眉柳莺
Phylloscopus inornatus

【英文名】
Yellow-browed Warbler
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1、2、10～12）。
状况：常见。

LC : 9 ~ 10 cm

黄腰柳莺
Phylloscopus proregulus

【英文名】
Pallas's Leaf Warbler
【国内分布状况】
繁殖于东北、华北，迁徙及越冬于华北、华中、华东、华南和西南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1～3、10～12）。
状况：常见。

LC : 12 ~ 13 cm

巨嘴柳莺
Phylloscopus schwarzi

【英文名】Radde's Warbler
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10）。状况：少见。

LC : 11 ~ 12 cm

褐柳莺
Phylloscopus fuscatus

【英文名】
Dusky Warbler
【国内分布状况】
繁殖于东北、华北以及甘肃、四川，迁徙及越冬于华东、华中、华南、西南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1～3、10～12）。
状况：常见。

LC : 10 ~ 11 cm

棕腹柳莺
Phylloscopus subaffinis

【英文名】
Buff-throated Warbler
【国内分布状况】
主要分布于华中、东南、西南各地的中、高海拔山地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留（冬季垂直迁徙）。状况：少见。

LC : 11 ~ 12 cm

冕柳莺
Phylloscopus coronatus

【英文名】
Eastern Crowned Warbler
【国内分布状况】
见于东北、华北、华中、华东、西南、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、9）。状况：少见。

LC : 10 ~ 11 cm

白眶鹟莺
Phylloscopus intermedius

【英文名】White-spectacled Warbler
【国内分布状况】分布于西南、中南、华南、东南的中、高海拔山地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。
模式标本产地：武夷山国家公园

2016 年 7 月 24 日在黄岗山海拔 1900 米处有单羽记录，为近年福建鸟类新记录

LC : 10 ~ 11 cm

灰冠鹟莺
Phylloscopus tephrocephalus

【英文名】
Grey-crowned Warbler
【国内分布状况】
见于西南、中部、东南地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况： 罕见。

LC : 11 ~ 12 cm

比氏鹟莺
Phylloscopus valentini

【英文名】Bianchi's Warbler
【国内分布状况】分布于华中、华东和华南高海拔地区以及陕西、甘肃、云南、四川。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。

为近年福建鸟类新记录

LC : 11 ~ 12 cm

淡尾鹟莺
Phylloscopus soror

【英文名】Plain-tailed Warbler
【国内分布状况】分布于陕西、四川、贵州、广西、江西和福建中、高海拔山地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：罕见。

2020 年 6 月 13 日在武夷山国家公园桐木区域有单羽记录，为近年福建鸟类新记录

LC : 11 ~ 12 cm

双斑绿柳莺
Phylloscopus plumbeitarsus

【英文名】Two-barred Warbler
【国内分布状况】见于东北、华北、西南、华中、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

2018 年 10 月 6 日在武夷山国家公园桐木段有单羽记录

LC : 10 ~ 11 cm

淡脚柳莺
Phylloscopus tenellipes

【英文名】
Pale-legged Warbler
【国内分布状况】
繁殖于东北，迁徙经华东至华南沿海，少量越冬于海南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4）。状况：少见。

LC : 12 ~ 13 cm

极北柳莺
Phylloscopus borealis

【英文名】Arctic Warbler
【国内分布状况】繁殖于东北和西北，越冬于华南以及台湾，迁徙时见于东部各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（5、9、10）。状况：易见。

LC : 9 ~ 10 cm

栗头鹟莺
Phylloscopus castaniceps

【英文名】Chestnut-crowned Warbler
【国内分布状况】分布于华中、西南、华东和华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 10 ~ 11 cm

黑眉柳莺
Phylloscopus ricketti

【英文名】Sulphur-breasted Warbler
【国内分布状况】分布于中部地区、西南、东南、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 10 ~ 11 cm

冠纹柳莺
Phylloscopus claudiae

【英文名】
Claudia's Leaf Warbler

【国内分布状况】
繁殖于华中至华北的山地，迁徙经华中至西南的大部分地区，华东有过境记录。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（3、4）。状况：少见。

LC : 10 ~ 12 cm

华南冠纹柳莺
Phylloscopus goodsoni

【英文名】
Hartert's Leaf Warbler

【国内分布状况】
分布于湖北、贵州、广西、安徽、江西、浙江、福建、广东。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 10 ~ 12 cm

白斑尾柳莺
Phylloscopus ogilviegranti

【英文名】Kloss's Leaf Warbler

【国内分布状况】分布于中部地区以及贵州、福建、广东。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

苇莺科 Acrocephalidae

LC : 17 ~ 19 cm

东方大苇莺
Acrocephalus orientalis

【英文名】
Oriental Reed Warbler

【国内分布状况】
繁殖于东北、华北、华中、华东以及甘肃、青海，迁徙和越冬于中国南方地区。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（5～11）。状况：易见。

LC : 13 ~ 14 cm

黑眉苇莺
Acrocephalus bistrigiceps

【英文名】
Black-browed Reed Warbler

【国内分布状况】
繁殖于东北、华北、华中、华东，少量越冬于东南、华南，包括海南和台湾。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（5、10）。状况：易见。

LC : 13 ~ 14 cm

钝翅苇莺
Acrocephalus concinens

【英文名】
Blunt-winged Warbler

【国内分布状况】
繁殖于华东、华北、华中以及广西、贵州，迁徙经过华北、华东、华中和西南。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

LC : 18 ~ 20 cm

厚嘴苇莺
Arundinax aedon

【英文名】
Thick-billed Warbler

【国内分布状况】
繁殖于东北、华北，迁徙时见于东北、华北至西南、东南的大部分地区。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（5、6）。状况：少见。

蝗莺科 Locustellidae

LC : 12 ~ 14 cm

小蝗莺
Helopsaltes certhiola

【英文名】Pallas's Grasshopper Warbler

【国内分布状况】繁殖于东北、华北、西北，迁徙经过我国中部、东部至南方大部分地区。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

LC : 13 ~ 15 cm

棕褐短翅莺
Locustella luteoventris

【英文名】
Brown Bush Warbler

【国内分布状况】
分布于秦岭以南的华中、华东、华南、西南地区的高海拔山地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

标本采集于武夷山国家公园武夷山市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆

LC : 13 ~ 15 cm

高山短翅莺
Locustella mandelli

【英文名】
Russet Bush Warbler

【国内分布状况】
分布于西藏、云南、湖南、广西、广东、江西、福建、浙江的高海拔山地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

模式标本产地：武夷山国家公园

扇尾莺科 Cisticolidae

LC : 10 ~ 14 cm

棕扇尾莺
Cisticola juncidis

【英文名】
Zitting Cisticola

【国内分布状况】
分布于华北、华中、华东、华南、西南。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 15 ~ 16 cm

山鹪莺
Prinia striata

【英文名】
Swinhoe's Prinia
【国内分布状况】
分布于陕西、四川、重庆、云南、贵州、湖南、江苏、浙江、江西、福建、广东和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 15 ~ 20 cm

黑喉山鹪莺
Prinia superciliaris

【英文名】
Hill Prinia
【国内分布状况】
见于西南、华南、东南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：罕见。

2016 年 2 月 20 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 12 ~ 15 cm

黄腹山鹪莺
Prinia flaviventris

【英文名】
Yellow-bellied Prinia
【国内分布状况】
分布于长江流域以南地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 12 ~ 15 cm

纯色山鹪莺
Prinia inornata

【英文名】
Plain Prinia
【国内分布状况】
分布于西南、华中、华东、华南，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 10 ~ 14 cm

长尾缝叶莺
Orthotomus sutorius

【英文名】Common Tailorbird
【国内分布状况】分布于西南、华东、华南，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

鹛科 Timaliidae

LC : 11 ~ 12 cm

红头穗鹛
Cyanoderma ruficeps

【英文名】
Rufous-capped Babbler
【国内分布状况】
分布于西南、华中、华南、东南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 16 ~ 19 cm

棕颈钩嘴鹛
Pomatorhinus ruficollis

【英文名】Streak-breasted Scimitar Babbler
【国内分布状况】分布于中部地区、西南、华南、华东各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 22 ~ 24 cm

华南斑胸钩嘴鹛
Erythrogenys swinhoei

【英文名】
Grey-sided Scimitar Babbler
【国内分布状况】
分布于安徽、江西、浙江、福建、广西、湖南、广东。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

幽鹛科 Pellorneidae

LC : 13 ~ 14 cm

褐顶雀鹛
Schoeniparus brunneus

【英文名】
Dusky Fulvetta
【国内分布状况】
分布于中部地区、西南、华东、华南各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

模式标本产地：武夷山国家公园

雀鹛科 Alcippeidae

NR : 12 ~ 13 cm

淡眉雀鹛
Alcippe hueti

【英文名】
Huet's Fulvetta
【国内分布状况】
分布于安徽、浙江、江西、福建、广东、海南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

模式标本产地：武夷山国家公园

噪鹛科 Leiothrichidae

LC : 26 ~ 28 cm

赤尾噪鹛
Trochalopteron milnei

【英文名】Red-tailed Laughingthrush
【国内分布状况】分布于云南、广西、贵州、四川、重庆、湖南、广东、福建。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。

模式标本产地：武夷山国家公园

II

标本采集于武夷山国家公园邵武市区域，现标本去向不明，武夷山种群数十年无观察记录

LC : 14 ~ 15 cm

红嘴相思鸟
Leiothrix lutea

II

【英文名】
Red-billed Leiothrix
【国内分布状况】
分布于中部地区、西南、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 21 ~ 24 cm

画眉
Garrulax canorus

II

【英文名】Hwamei
【国内分布状况】分布于中部地区、华北、华东、西南、华南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

（吴英 摄）

LC : 24 ~ 32 cm

小黑领噪鹛
Garrulax monileger

【英文名】
Lesser Necklaced Laughingthrush
【国内分布状况】
分布于长江流域以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 23 ~ 26 cm

灰翅噪鹛
Ianthocincla cineracea

【英文名】Moustached Laughingthrush
【国内分布状况】分布于中部地区、西南、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。

I. c. cinereiceps 亚种

LC : 22 ~ 25 cm

白颊噪鹛
Pterorhinus sannio

【英文名】
White-browed Laughingthrush
【国内分布状况】
分布于中部地区、西南、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 21 ~ 26 cm

黑脸噪鹛
Pterorhinus perspicillatus

【英文名】
Masked Laughingthrush
【国内分布状况】
分布于中部地区、西南、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 28 ~ 34 cm

黑领噪鹛
Pterorhinus pectoralis

【英文名】Greater Necklaced Laughingthrush
【国内分布状况】分布于中部地区、西南、华东、华南各地，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 27 ~ 29 cm

棕噪鹛
Pterorhinus berthemyi

II

【英文名】
Buffy Laughingthrush
【国内分布状况】
中国鸟类特有种。主要分布在我国东南地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

模式标本产地：武夷山国家公园

鸦雀科 Paradoxornithidae

LC : 12 ~ 14 cm

褐头雀鹛
Fulvetta manipurensis

【英文名】
Streak-throated Fulvetta
【国内分布状况】
分布于云南、广西和武夷山区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 11 ~ 13 cm

棕头鸦雀
Sinosuthora webbiana

【英文名】Vinous-throated Parrotbill
【国内分布状况】分布于东北、华北、华东、华中、西南、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 9 ~ 11 cm

金色鸦雀
Suthora verreauxi

【英文名】Golden Parrotbill
【国内分布状况】分布于西南、华南和武夷山区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：罕见。
模式标本产地：武夷山国家公园

2020 年 4 月 18 日、2020 年 7 月 5 日在武夷山国家公园黄岗山分别有小群记录

LC : 9 ~ 10 cm

短尾鸦雀
Neosuthora davidiana

II

【英文名】
Short-tailed Parrotbill
【国内分布状况】
又名挂墩鸦雀，分布于云南、湖南、广东、浙江、福建。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 16 ~ 19 cm

灰头鸦雀
Psittiparus gularis

【英文名】Grey-headed Parrotbill
【国内分布状况】分布于云南、广西、四川、安徽、江西、浙江、福建、广东、海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。
模式标本产地：武夷山国家公园

绣眼鸟科 Zosteropidae

LC : 14 ~ 15 cm

栗颈凤鹛
Staphida torqueola

【英文名】
Chestnut-collared Yuhina

【国内分布状况】
分布于中部地区、西南、华东、华南各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 10 ~ 11 cm

黑颏凤鹛
Yuhina nigrimenta

【英文名】Black-chinned Yuhina

【国内分布状况】分布于中部地区、西南、东南、华南各地。

【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 10 ~ 11 cm

暗绿绣眼鸟
Zosterops simplex

【英文名】
Swinhoe's White-eye

【国内分布状况】
分布于西至甘肃南部，东至江苏和台湾，南至长江以南各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

（吴英 摄）

丽星鹪鹛科 Elachuridae

LC : 9 ~ 10 cm

丽星鹪鹛
Elachura formosa

【英文名】
Spotted Elachura

【国内分布状况】
分布于长江流域及其以南各地。

【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：罕见。

鸭科 Sittidae

LC : 12 ~ 13 cm

普通鸭
Sitta europaea

【英文名】
Eurasian Nuthatch
【国内分布状况】
分布于东北、华北、华中、西南、华东、华南以及新疆。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

S. e. sinensis 亚种

S. e. sinensis 亚种

S. n. montium 亚种

LC : 12 ~ 13 cm

栗臀鸭
Sitta nagaensis

【英文名】
Chestnut-vented Nuthatch
【国内分布状况】
分布于西藏、云南、四川、贵州、广西、江西、福建。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

模式标本产地：武夷山国家公园

S. n. montium 亚种

椋鸟科 Sturnidae

LC : 23 ~ 28 cm

八哥
Acridotheres cristatellus

【英文名】Crested Myna
【国内分布状况】分布于黄河以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。



LC : 19 ~ 23 cm

灰椋鸟
Spodiopsar cineraceus

【英文名】
White-cheeked Starling
【国内分布状况】
繁殖于东北、华北、西北东部，迁徙及越冬于黄河以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1～5、10～12）。状况：常见。

LC : 18 ~ 23 cm

丝光椋鸟
Spodiopsar sericeus

【英文名】Red-billed Starling
【国内分布状况】分布于华北、华中、华东、华南、西南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～5、10～12）。状况：常见。

（衷柏夷 摄）

LC : 27 ~ 30 cm

黑领椋鸟
Gracupica nigricollis

【英文名】Black-collared Starling
【国内分布状况】分布于长江流域以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 16 ~ 19 cm

北椋鸟
Agropsar sturninus

【英文名】Daurian Starling
【国内分布状况】繁殖于东北和华北，向西可达陕西，迁徙经我国东部各地，包括台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5）。状况：罕见。

2014 年 4 月 7 日和 2019 年 5 月 12 日在武夷山国家公园武夷山市区域分别有一笔单羽记录

LC : 18 ~ 21 cm

灰背椋鸟
Sturnia sinensis

【英文名】White-shouldered Starling
【国内分布状况】繁殖于华南及东南沿海地区，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（8、10）。状况：少见。

2014 年 11 月～12 月在武夷山国家公园南源岭农田有 6 羽记录

LC : 19 ~ 22 cm

紫翅椋鸟
Sturnus vulgaris

【英文名】
Common Starling
【国内分布状况】
分布于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：迷（11、12）。状况：罕见。

鸫科 Turdidae

LC : 20 ~ 23 cm

橙头地鸫
Geokichla citrina

【英文名】Orange-headed Thrush
【国内分布状况】分布于长江流域，冬季南迁经过南方各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（3）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

2015 年 3 月 21 日在武夷山国家公园景区有单羽记录

LC : 20 ~ 23 cm

白眉地鸫
Geokichla sibirica

【英文名】Siberian Thrush
【国内分布状况】繁殖于东北地区，迁徙经过中部、东部各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

2015 年 4 月 29 日在武夷山国家公园四新区域有单羽红外线相机记录

LC : 26 ~ 30 cm

怀氏虎鸫
Zoothera aurea

【英文名】White's Thrush
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1、2、10～12）。状况：易见。

LC : 19 ~ 25 cm

灰背鸫
Turdus hortulorum

【英文名】Grey-backed Thrush
【国内分布状况】繁殖于东北，迁徙及越冬于我国南方各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1、2、11、12）。状况：易见。

LC : 18 ~ 23 cm

乌灰鸫
Turdus cardis

【英文名】Japanese Thrush
【国内分布状况】见于我国中部、东部、西南各地，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（11）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

2016 年 11 月 19 日在武夷山国家公园桐木区域有单羽记录

LC : 28 ~ 29 cm

灰翅鸫
Turdus boulboul

【英文名】Grey-winged Blackbird
【国内分布状况】分布于西南、华中各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：居留状况不明。状况：罕见。

雄鸟（刘刚 摄）

雌鸟（刘刚 摄）

2019 年 5 月 2 日在黄岗山有单羽红外线相机记录，为近年福建鸟类新记录

LC : 28 ~ 29 cm

乌鸫
Turdus mandarinus

【英文名】
Chinese Blackbird
【国内分布状况】
分布于我国北起华北，西至甘肃、四川、云南，南至海南。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 20 ~ 24 cm

红尾鸫
Turdus naumanni

【英文名】Naumann's Thrush
【国内分布状况】见于西藏、海南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～3、11、12）。状况：易见。

LC : 20 ~ 25 cm

白眉鸫
Turdus obscurus

【英文名】Eyebrowed Thrush
【国内分布状况】繁殖于黑龙江北部，迁徙经西部除外的全国大部分地区，越冬于华南和西南地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅、冬（1、2、11、12）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

LC : 22 ~ 25 cm

白腹鸫
Turdus pallidus

【英文名】Pale Thrush
【国内分布状况】繁殖于东北地区，迁徙经华北，越冬于华东、华南及西南地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～3、11、12）。状况：易见。

雄鸟（杨林 摄）

雌鸟

LC : 19 ~ 24 cm

斑鸫
Turdus eunomus

【英文名】
Dusky Thrush
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1～3、11、12）。状况：易见。

鹟科 Muscicapidae

LC : 19 ~ 22 cm

鹊鸲
Copsychus saularis

【英文名】Oriental Magpie Robin
【国内分布状况】广泛分布于长江流域及其以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟


雌鸟

LC : 13 ~ 15 cm

灰纹鹟
Muscicapa griseisticta

【英文名】Grey-streaked Flycatcher
【国内分布状况】主要见于我国东部地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5、10）。状况：易见。

LC : 12 ~ 14 cm

乌鹟
Muscicapa sibirica

【英文名】
Dark-sided Flycatcher
【国内分布状况】
主要分布于我国东部和中部各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（8～10）。状况：少见。

LC : 12 ~ 14 cm

北灰鹟
Muscicapa dauurica

【英文名】
Asian Brown Flycatcher
【国内分布状况】
繁殖于东北，迁徙时主要见于我国东部各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、5、9、10）。状况：少见。

LC : 12 ~ 14 cm

褐胸鹟
Muscicapa muttui

【英文名】Brown-breasted Flycatcher
【国内分布状况】主要见于西南、华南、华东各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：居留状况不明。状况：罕见。

2019 年 6 月 30 日在武夷山国家公园桐木区域有单羽记录

LC : 11 ~ 13 cm

棕尾褐鹟
Muscicapa ferruginea

【英文名】Ferruginous Flycatcher
【国内分布状况】主要分布于西南、东南、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：易见。

VU : 14 ~ 16 cm

白喉林鹟
Cyornis brunneatus

II

【英文名】Brown-chested Jungle Flycatcher
【国内分布状况】见于华东、华中、华南各地，为国内罕见的夏候鸟。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（4～6）。状况：罕见。
模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 13 ~ 15 cm

海南蓝仙鹟
Cyornis hainanus

【英文名】Hainan Blue Flycatcher
【国内分布状况】分布于西南、华南、东南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（4～8）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

LC : 16 ~ 19 cm

棕腹大仙鹟
Niltava davidi

II

【英文名】
Fujian Niltava
【国内分布状况】
主要分布于华中、西南、华南各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：夏（4～9）。状况：少见。

模式标本产地：武夷山国家公园

雄鸟

雌鸟（廖章文 摄）

LC : 13 ~ 16 cm

棕腹仙鹟
Niltava sundara

【英文名】Rufous-bellied Niltava
【国内分布状况】分布于中部地区、西南、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：居留状况不明。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

2020 年 4 月 25 日在武夷山国家公园桐木区域有二羽雄鸟记录

LC : 11 ~ 13 cm

小仙鹟
Niltava macgrigoriae

【英文名】Small Niltava
【国内分布状况】分布于西南以及江西、福建。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

雄鸟

雌鸟

LC : 14 ~ 17 cm

白腹蓝鹟
Cyanoptila cyanomelana

【英文名】Blue-and-white Flycatcher
【国内分布状况】主要分布于东部地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、10、11）。状况：易见。

雄鸟

雌鸟

LC : 13 ~ 17 cm

铜蓝鹟
Eumyias thalassinus

【英文名】
Verditer Flycatcher
【国内分布状况】
主要分布于长江流域以南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 12 ~ 13 cm

白喉短翅鸫
Brachypteryx leucophris

【英文名】Lesser Shortwing
【国内分布状况】主要分布于西南、华南、东南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：罕见。
模式标本产地：武夷山国家公园

NR : 12 ~ 13 cm

中华短翅鸫
Brachypteryx sinensis

【英文名】
Chinese Shortwing
【国内分布状况】
分布于贵州、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 13 ~ 15 cm

红尾歌鸲
Larvivora sibilans

【英文名】
Rufous-tailed Robin
【国内分布状况】
见于东北、华北、华中、华东、华南、西南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4）。状况：易见。

标本 1999 年 9 月下旬采集于武夷山国家公园景区，现藏于武夷山青少年考察基地标本馆

LC : 13 ~ 15 cm

日本歌鸲
Larvivora akahige

【英文名】
Japanese Robin
【国内分布状况】
主要见于东南沿海地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：居留状况不明。状况：罕见。

LC : 14 ~ 16 cm

蓝喉歌鸲
Luscinia svecica

Ⅱ

【英文名】Bluethroat
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～4、11、12）。状况：易见。

雄鸟

雌鸟

LC : 14 ~ 16 cm

红喉歌鸲
Calliope calliope

Ⅱ

【英文名】Siberian Rubythroat
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～3、11、12）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

LC : 12 ~ 14 cm

红胁蓝尾鸲
Tarsiger cyanurus

【英文名】Orange-flanked Bluetail
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～3、10～12）。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

LC : 12 ~ 14 cm

小燕尾
Enicurus scouleri

【英文名】Little Forktail
【国内分布状况】分布于中部地区和长江流域以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 22 ~ 25 cm

灰背燕尾
Enicurus schistaceus

【英文名】Slaty-backed Forktail
【国内分布状况】分布于西南、中南、东南、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 25 ~ 28 cm

白冠燕尾
Enicurus leschenaulti

【英文名】White-crowned Forktail
【国内分布状况】分布于我国中部地区、华东、华南、西南各地，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

LC : 25 ~ 27 cm

斑背燕尾
Enicurus maculatus

【英文名】Spotted Forktail
【国内分布状况】分布于西南、长江流域以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。

LC : 29 ~ 35 cm

紫啸鸫
Myophonus caeruleus

【英文名】
Blue Whistling Thrush
【国内分布状况】
分布于东北以及青海除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 12 ~ 14 cm

白眉姬鹟
Ficedula zanthopygia

【英文名】Yellow-rumped Flycatcher
【国内分布状况】主要见于我国东部。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5）。状况：少见。

雄鸟

雄鸟

雌鸟

LC : 13 ~ 15 cm

黄眉姬鹟
Ficedula narcissina

【英文名】Narcissus Flycatcher
【国内分布状况】迁徙经华北、华东、华南各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4）。状况：少见。


雄鸟

雄鸟

雌鸟

LC : 12 ~ 13 cm

鸲姬鹟
Ficedula mugimaki

【英文名】Mugimaki Flycatcher
【国内分布状况】主要见于我国东部。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（10、11）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

雄鸟

雌鸟

LC : 12 ~ 13 cm

红喉姬鹟
Ficedula albicilla

【英文名】
Taiga Flycatcher
【国内分布状况】
见于全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4、9、10）。状况：易见。

LC : 13 ~ 15 cm

北红尾鸲
Phoenicurus auroreus

【英文名】Daurian Redstart
【国内分布状况】见于新疆除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1、2、10 ～ 12）。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

LC : 12 ~ 13 cm

红尾水鸲
Phoenicurus fuliginosus

【英文名】Plumbeous Water Redstart
【国内分布状况】主要分布于东部、南部，包括台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

LC : 18 ~ 19 cm

白顶溪鸲
Phoenicurus leucocephalus

【英文名】White-capped Water Redstart
【国内分布状况】主要见于华北、西北、华中、西南各地，在安徽、浙江、江西、福建的山区溪流中有候鸟记录。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～5、11、12）。状况：少见。

LC : 20 ~ 23 cm

蓝矶鸫
Monticola solitarius

【英文名】Blue Rock Thrush
【国内分布状况】主要分布于中部、东部。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：少见。



M. s. pandoo 雄鸟

雌鸟

M. s. philippensis 亚种，雄鸟

LC : 21 ~ 23 cm

栗腹矶鸫
Monticola rufiventris

【英文名】Chestnut-bellied Rock Thrush
【国内分布状况】分布于西南、华中、东南、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

雌鸟

雄鸟

亚成鸟

LC : 14 ~ 15 cm

灰林鹏
Saxicola ferreus

【英文名】Grey Bushchat
【国内分布状况】分布于西南、华中、华东、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

NR : 12 ~ 14 cm

东亚石䳭
Saxicola stejnegeri

【英文名】Stejneger's Stonechat
【国内分布状况】广布于东部各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留、冬。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

黄岗山留鸟繁殖羽

武夷山国家公园黄岗山有独立留鸟种群

河乌科
Cinclidae

LC : 18 ~ 24 cm

褐河乌
Cinclus pallasii

【英文名】Brown Dipper
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

叶鹎科
Chloropseidae

LC : 15 ~ 19 cm

橙腹叶鹎
Chloropsis hardwickii

【英文名】Orange-bellied Leafbird
【国内分布状况】分布于西南、东南、华南各地，包括海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟

雄鸟

雌鸟

雌鸟

雌鸟

啄花鸟科 Dicaeidae

LC : 8 ~ 10 cm

红胸啄花鸟
Dicaeum ignipectus

【英文名】Fire-breasted Flowerpecker
【国内分布状况】主要分布于西南、华南、东南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

太阳鸟科 Nectariniidae

LC : 9 ~ 11 cm

叉尾太阳鸟
Aethopyga christinae

【英文名】Fork-tailed Sunbird
【国内分布状况】分布于云南、贵州、四川、重庆、湖南、江西、浙江、福建、广西、广东、海南。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

雄鸟

雀科 Passeridae

LC : 11 ~ 14 cm

山麻雀
Passer cinnamomeus

【英文名】
Russet Sparrow
【国内分布状况】
主要分布于东部、中部、西南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：易见。

上为雄鸟，下为雌鸟

LC : 12 ~ 15 cm

麻雀
Passer montanus

【英文名】Eurasian Tree Sparrow
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

梅花雀科
Estrildidae

LC : 10 ~ 12 cm

斑文鸟
Lonchura punctulata

【英文名】Scaly-breasted Munia
【国内分布状况】分布于长江流域以南各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

LC : 10 ~ 12 cm

白腰文鸟
Lonchura striata

【英文名】
White-rumped Munia
【国内分布状况】
分布于黄河流域以南各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：常见。

鹡鸰科 Motacillidae

LC : 16 ~ 18 cm

山鹡鸰
Dendronanthus indicus

【英文名】Forest Wagtail
【国内分布状况】见于东北、华北、华中、华东、西南、华南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、9）。状况：罕见。

标本采集于武夷山国家公园武夷山市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆

LC : 16 ~ 19 cm

黄鹡鸰
Motacilla tschutschensis

【英文名】Eastern Yellow Wagtail
【国内分布状况】见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、9、10）。状况：易见。

M. t. tschutschensis 亚种

M. t. taivana 亚种

M. t. macronyx 亚种

LC : 17 ~ 19 cm

白鹡鸰
Motacilla alba

【英文名】White Wagtail
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留、冬。状况：常见。

M. a. ocularis 亚种

M. a. leucopsis 亚种

M. a. baicalensis 亚种

LC : 16 ~ 20 cm

黄头鹡鸰
Motacilla citreola

【英文名】Citrine Wagtail
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

标本采集于武夷山国家公园武夷山市区域，现藏于福建师范大学动物标本馆

LC : 16 ~ 18 cm

灰鹡鸰
Motacilla cinerea

【英文名】Grey Wagtail
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：常见。

夏羽

冬羽

LC : 17 ~ 18 cm

理氏鹨
Anthus richardi

【英文名】
Richard's Pipit
【国内分布状况】
分布于青藏高原、云南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、11、12）。状况：易见。

LC : 15 ~ 17 cm

田鹨
Anthus rufulus

【英文名】
Paddyfield Pipit
【国内分布状况】
分布于云南、四川、广东、福建、广西、贵州。
【国家公园分布状况】
居留类型：冬（1 ～ 4、11、12）。状况：常见。

LC : 15 ~ 17 cm

树鹨
Anthus hodgsoni

【英文名】Olive-backed Pipit
【国内分布状况】分布于新疆除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～4、10～12）。状况：常见。

LC : 14 ~ 17 cm

黄腹鹨
Anthus rubescens

【英文名】Buff-bellied Pipit
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～3、10～12）。状况：常见。

LC : 14 ~ 15 cm

北鹨
Anthus gustavi

【英文名】
Pechora Pipit
【国内分布状况】
迁徙经东部地区。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（4）。状况：罕见。

2015 年 4 月 19 日、2019 年 4 月 21 日在武夷山国家公园南源岭农田分别有单羽记录

LC : 14 ~ 15 cm

红喉鹨
Anthus cervinus

【英文名】Red-throated Pipit
【国内分布状况】迁徙季节见于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1～4、10～12）。状况：易见。

繁殖羽

非繁殖羽

LC : 15 ~ 17 cm

粉红胸鹨
Anthus roseatus

【英文名】Rosy Pipit
【国内分布状况】繁殖于北自新疆、青藏高原至华北，南至四川及湖北，南迁越冬至西南。武夷山有孤立留鸟种群。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。

繁殖羽

非繁殖羽

LC : 16 ~ 18 cm

水鹨
Anthus spinoletta

【英文名】Water Pipit
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1、2、10 ～ 12）。状况：易见。

雄鸟

燕雀科 Fringillidae

LC : 13 ~ 16 cm

燕雀
Fringilla montifringilla

【英文名】
Brambling
【国内分布状况】
分布于西藏、海南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 3、10 ～ 12）。状况：常见。

雌鸟

LC : 15 ~ 18 cm

黑尾蜡嘴雀
Eophona migratoria

【英文名】
Chinese Grosbeak
【国内分布状况】
分布于西北以及海南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、11、12）。
状况：易见。

雄鸟

雌鸟

LC : 20 ~ 24 cm

黑头蜡嘴雀
Eophona personata

【英文名】
Japanese Grosbeak
【国内分布状况】
分布于华中、华东各地，包括台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：旅（10）。状况：罕见。

2015 年 10 月 24 日在武夷山国家公园桐木段有单羽记录

LC : 12 ~ 14 cm

金翅雀
Chloris sinica

【英文名】Grey-capped Greenfinch
【国内分布状况】分布于新疆、西藏、海南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1 ～ 5、10 ～ 12）。状况：常见。

LC : 13 ~ 15 cm

普通朱雀
Carpodacus erythrinus

【英文名】Common Rosefinch
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏（4、7）、冬（12）。状况：少见。

雄鸟

雄鸟

雌鸟

雌鸟

LC : 16 ~ 17 cm

褐灰雀
Pyrrhula nipalensis

【英文名】Brown Bullfinch
【国内分布状况】分布于西藏、云南、山东、陕西、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：易见。
模式标本产地：武夷山国家公园

LC : 11 ~ 12 cm

黄雀
Spinus spinus

【英文名】
Eurasian Siskin
【国内分布状况】
分布于宁夏、西藏除外的全国各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1、2、12）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

鹀科 Emberizidae

LC : 16 ~ 19 cm

凤头鹀
Emberiza lathami

【英文名】
Crested Bunting
【国内分布状况】
分布于西南、华中、华南、东南各地。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：留。状况：少见。

雌鸟

雄鸟

LC : 12 ~ 14 cm

蓝鹀
Emberiza siemsseni

II

【英文名】Slaty Bunting
【国内分布状况】中国鸟类特有种。分布自四川西部以东、秦岭以南、华南北部以北，东至浙江西北部山区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：留。状况：罕见。
模式标本产地：武夷山国家公园

雄鸟

雌鸟

LC : 15 ~ 18 cm

三道眉草鹀
Emberiza cioides

【英文名】Meadow Bunting
【国内分布状况】分布于西藏、海南除外的全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（2）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

2016 年 2 月 27 日在武夷山国家公园南源岭农田有单羽记录

LC : 13 ~ 16 cm

白眉鹀
Emberiza tristrami

【英文名】Tristram's Bunting
【国内分布状况】繁殖于东北，迁徙经东部各地，越冬于长江流域以南各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、10 ～ 12）。状况：易见。

雄鸟

雌鸟

LC : 14 ~ 15 cm

栗耳鹀
Emberiza fucata

【英文名】Chestnut-eared Bunting
【国内分布状况】分布于新疆、青海除外的全国各地。武夷山有一独立种群。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：夏、冬。状况：易见。
模式标本产地：武夷山国家公园

雄鸟

雌鸟

LC : 11 ~ 14 cm

小鹀
Emberiza pusilla

【英文名】Little Bunting
【国内分布状况】分布于全国各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1 ～ 4、11、12）。状况：常见。

LC : 15.5 ~ 17.5 cm

黑头鹀
Emberiza melanocephala

【英文名】
Black-headed Bunting
【国内分布状况】
不定期出现在长江以南各地及西南、西北部分地区，为稀有冬候鸟或迷鸟。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：居留状况不明。状况：罕见。

2020 年 12 月 20 日在武夷山国家公园武夷山市区域有单羽记录

LC : 13 ~ 17 cm

黄眉鹀
Emberiza chrysophrys

【英文名】Yellow-browed Bunting
【国内分布状况】迁徙经东部地区，越冬于华南和华东各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅、冬（1 ～ 4、10 ～ 12）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

VU : 13 ~ 15 cm

田鹀
Emberiza rustica

【英文名】Rustic Bunting
【国内分布状况】迁徙经东北、华北以及新疆，越冬于华中、华东、华南各地，包括台湾。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1、2、10 ～ 12）。状况：常见。

雄鸟

雌鸟

LC : 15 ~ 16 cm

黄喉鹀
Emberiza elegans

【英文名】Yellow-throated Bunting
【国内分布状况】繁殖于东北、华北、华中、西南各地，迁徙及越冬于东部各地。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：冬（1、2）。状况：罕见。

雄鸟

雌鸟

CR : 14 ~ 16 cm

黄胸鹀
Emberiza aureola

I

【英文名】Yellow-breasted Bunting
【国内分布状况】繁殖于东北以及新疆，迁徙经我国大部分地区。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5、10、11）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

LC : 14 ~ 15 cm

栗鹀
Emberiza rutila

【英文名】Chestnut Bunting
【国内分布状况】繁殖于东北，迁徙经华北、华中及华东各地，包括台湾，越冬于华南沿海。
【国家公园分布状况】居留类型（月份）：旅（4、5、10、11）。状况：少见。

雄鸟

雌鸟

LC : 13.5 ~ 16 cm

灰头鹀
Emberiza spodocephala

【英文名】
Black-faced Bunting
【国内分布状况】
主要繁殖于东北，越冬于华东至华南各地，包括海南和台湾。
【国家公园分布状况】
居留类型（月份）：冬（1～5、10～12）。
状况：常见。

E. s. personata 亚种，雄鸟

E. s. sordida 亚种，雄鸟

E. s. spodocephala 亚种，雄鸟

E. s. spodocephala 亚种，雌鸟

后记

习近平总书记指出：建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待生态环境，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全做出贡献。保护鸟类资源是生态文明建设的重要内容，关系到人类的生存与发展，也是衡量一个国家、一个民族文明进步的重要标志。鸟类是与人类接触最多的野生动物之一，是自然生态系统的重要成员，为维护生态系统的平衡发挥着不可替代的作用。同时，鸟类对栖息地的敏感性非常高，是一个体现地方自然生态系统功能和发展的指示类群。

武夷山国家公园坐落在福建和江西两省的交界、武夷山脉中段，区域内峰峦叠嶂、溪流众多，主峰黄岗山海拔 2160.8 米，是中国华东最高峰，有“东南屋脊”美称，最大海拔高差达 1700 米，复杂的生态系统和特殊的地理位置以及气候条件使这里成为地质演变过程中动植物的“天然避难所”，是世界同纬度地带动植物种类最丰富的地区。鸟类也是如此，这里分布着中国华东地区最具代表性的高海拔各种留鸟种群，如粉红胸鹦、黄腹树莺、中华短翅鸫、金色鸦雀、比氏鹟莺、淡尾鹟莺、白眶鹟莺、褐头雀鹛、淡绿鹎鹛、红翅鹎鹛、蓝鹀、褐灰雀、华南冠纹柳莺、白斑尾柳莺、黑眉柳莺、黄眉林雀、小仙鹟、铜蓝鹟、栗臀鸲、赤尾噪鹛、白背啄木鸟、棕腹大仙鹟、斑头大翠鸟、斑背燕尾等等；同时武夷山区域又是候鸟迁徙的重要通道，不少东部地区罕见的鸟种在这里驻足或繁殖，如白喉林鹟、褐胸鹟、棕尾褐鹟、海南蓝仙鹟、中杜鹃、小杜鹃等等。在中国东部及东南地区极具代表性，是著名的鸟类模式标本产地，是名副其实的“鸟的天堂”。

武夷山国家公园鸟类调查有 140 年的历史，积累了大量的科考资料和数据，特别是近年来武夷山国家公园管理局和福建省武夷山生物研究所积极组织科研单位和观鸟拍鸟爱好者开展不间断的鸟类调查工作，同时系统整理了百年来历次科考的资料和数据，剔除了一部分没有足够证据资料证明的鸟种（如白腹黑啄木鸟、红头潜鸭、戴菊、红耳鹎等）和有一些证据资料但存有疑问的鸟种（如：角鹬鹬、棕腹啄木鸟、白腹鹞、澳南沙锥等），力求客观。现统计出武夷山国家公园分布或出现的鸟类共计 390 种，分隶于 21 目 77 科 222 属。在此基础上编撰本书。

在本书即将完稿之际，我们也有些许遗憾：由于我们所进行的调查工作基本上在黄岗山东南坡及其周边区域，虽然在桐木关口至黄岗山路段的调查数据一定程度上也反映了武夷山西北坡（江西武夷山国家级自然保护区）的鸟类资源概貌，但数据和信息有限，同时双方未能在鸟类调查和研究方面有过交流。比如：江西武夷山国家级自然保护区在鸟类调查中记录了蓝喉仙鹟、点胸鸦雀、赤胸鸫、黑喉噪鹛、纯色啄花鸟、黑枕王鹟、灰斑鸠、黄腹柳莺、仙八色鸫、远东苇莺等十余种鸟类，但东南坡福建区域至今无发现记录；江西对黄腹角雉等雉类的研究处于全国领先地位。我们期待今后有条件时能与江西的同仁携手合作，共襄盛举。

在长期的鸟类调查过程中，我们图片拍摄技术的提高、找鸟认鸟能力的加强都得益于各地鸟类爱好者的帮助和支持，他们是著名鸟类摄影师、中国《鸟网》和爱鸟国际高级顾问陈林；著名鸟类识别专家、中国《鸟网》识别版原版主徐克阳；鸟类识别专家杭州钱程；观鸟达人、中国年度观鸟纪录保持者董文晓；厦门大学环境与生态学院林清贤教授；河北青县李玉山；北京宋炜东；陕西臧晓博；江西南昌廖章文；广东汕头柯志峰；福建厦门刘刚、彭志伟、吴小波、林鸮、郑毅东、郑铭伟；福建福州蔡卫和、肖炳祥、郑建平、陈峰、龙的传人、陈敏；福建三明吴群阵、廖金朋、黄维锦、杜建宁、罗联周、陈松敏；福建龙岩朱裕森、张闽；福建泉州邱德伟、林宏刚；福建南平摄影家协会主席阮宜平、顾问陈峰；武夷山摄影家协会主席余泽岚；部分厦门观鸟会、福建观鸟会、武夷观鸟会的鸟友等等。特别是本地鸟类摄影师杨林、衷柏夷、陈存恩、刘达友、赵向阳、吴英、袁仁荣、黄麟球、谢少和（邵武）、陈家发（延平），本地鸟类爱好者丁李青、叶立清、龚金海、聂连东、薛云星、王斌、左训开等鼎力支持；本书编撰期间，厦门刘刚、吴小波，三明吴群阵三位老师专门前来武夷山指导、审片。在此一并表示衷心感谢和诚挚敬意。

在本书完稿之时，2021 年 3 月 22 日，中共中央总书记习近平到福建考察调研，首站到达武夷山国家公园，给我们以极大的鼓励与鞭策。武夷山国家公园作为福建生态文明试验区的先行先试者，我们必将牢记总书记的深情嘱托，砥砺前行。

本书图片除署名摄影者，均为万勇的摄影作品。

限于能力和水平，加之编撰时间短暂，难免存在不足甚至遗漏，敬请专家、鸟友和读者批评指正。

参考文献

1. 郑作新，江智华，唐瑞干 . 福建武夷山地区鸟类区系初探 [J] 武夷科学 . 1981.
2. 福建省科学技术厅 . 中国 . 福建武夷山生物多样性研究信息平台 [M]. 北京：科学出版社，2012.
3. 程松林，刘江南，张雁云 . 武夷山自然保护区鸟类 [M]. 北京：科学出版社，2011.
4. 曲利明 . 中国鸟类图鉴 [M]. 福建：海峡书局出版社，2013.
5. 杨金 . 福建鸟类图鉴 [M]. 福建：海峡书局出版社，2018.
6. 刘阳，陈水华 . 中国鸟类观察手册 [M]. 湖南：湖南科学技术出版社，2021.
7. 唐兆和，唐庆圆，苏德政 . 武夷山风景名胜区鸟类资源调查报告 [R]. 武夷山风景名胜区管理委员会，2013.

中文笔画索引

二画

八声杜鹃 / 166
八哥 / 290

三画

三宝鸟 / 182
三道眉草鹀 / 367
大白鹭 / 070
大拟啄木鸟 / 193
大杜鹃 / 169
大沙锥 / 139
大黄冠啄木鸟 / 199
大斑啄木鸟 / 197
大鹃鹛 / 215
大嘴乌鸦 / 233
小鹱鹢 / 046
小天鹅 / 009
小云雀 / 240
小田鸡 / 105
小仙鹟 / 314
小白腰雨燕 / 180
小灰山椒鸟 / 214
小杜鹃 / 168
小鸦鹃 / 163
小鹀 / 370
小黑领噪鹛 / 278
小蝗莺 / 270
小燕尾 / 319
小鳞胸鹪鹛 / 254
山麻雀 / 342
山斑鸠 / 159
山鹡鸰 / 346
山鹪莺 / 272
勺鸡 / 036
叉尾太阳鸟 / 341

四画

巨嘴柳莺 / 259
比氏鹟莺 / 262
日本松雀鹰 / 090
日本歌鸲 / 317
中白鹭 / 069
中华秋沙鸭 / 030
中华短翅鸫 / 316
中华鹧鸪 / 032
中华攀雀 / 239
中杜鹃 / 169
中杓鹬 / 126
水雉 / 124
水鹨 / 356
牛头伯劳 / 218
牛背鹭 / 064
长耳鸮 / 177
长尾缝叶莺 / 274
长趾滨鹬 / 133
长嘴剑鸻 / 119
反嘴鹬 / 112
乌灰鸫 / 302
乌鸫 / 304
乌鹃 / 167
乌鹟 / 308
乌雕 / 085
凤头鹰鹛 / 045
凤头麦鸡 / 114
凤头鹀 / 365
凤头蜂鹰 / 081
凤头潜鸭 / 024
凤头鹰 / 088
方尾鹟 / 234
火斑鸠 / 160
双斑绿柳莺 / 263

五画

东方大苇莺 / 268
东亚石鹎 / 336
北灰鹟 / 309
北红尾鸲 / 329
北棕鸟 / 296
北鹨 / 353
北鹰鸮 / 174
田鹀 / 372
田鹨 / 351
四声杜鹃 / 168
丘鹬 / 137
白头鹎 / 244
白尾鹞 / 094
白顶溪鸲 / 331
白背啄木鸟 / 198
白冠燕尾 / 320
白眉山鹧鸪 / 034
白眉地鸫 / 299
白眉鸫 / 305
白眉鸭 / 016
白眉姬鹟 / 323
白眉鹀 / 368
白翅浮鸥 / 158
白胸苦恶鸟 / 108
白胸翡翠 / 183
白眶鹟莺 / 261
白颈长尾雉 / 042
白颈鸦 / 233
白琵鹭 / 050
白斑军舰鸟 / 074
白斑尾柳莺 / 267
白颊噪鹛 / 279
白喉红臀鹎 / 243
白喉针尾雨燕 / 179
白喉林鹟 / 310
白喉短翅鸫 / 316
白鹇 / 037
白腰文鸟 / 345
白腰杓鹬 / 127
白腰雨燕 / 179
白腰草鹬 / 142
白腹凤鹛 / 221
白腹鸫 / 306
白腹隼雕 / 087
白腹蓝鹟 / 315
白腿小隼 / 204
白鹡鸰 / 348
白额雁 / 008
白额燕鸥 / 156
白鹭 / 072
半蹼鹬 / 136
发冠卷尾 / 225
丝光椋鸟 / 293

六画

灰山椒鸟 / 211
灰头麦鸡 / 116
灰头鸦雀 / 283
灰头绿啄木鸟 / 201
灰头鹀 / 376
灰尾漂鹬 / 144
灰纹鹟 / 308
灰林鹏 / 335
灰卷尾 / 226
灰树鹊 / 232
灰背鸫 / 301
灰背椋鸟 / 297
灰背燕尾 / 320
灰冠鹟莺 / 261
灰翅鸫 / 303
灰翅噪鹛 / 279
灰胸竹鸡 / 035
灰脸鵟鹰 / 097
灰斑鸠 / 118
灰椋鸟 / 292
灰喉山椒鸟 / 212
灰鹤 / 109
灰鹡鸰 / 350
灰燕鹃 / 211
尖尾滨鹬 / 130
竹啄木鸟 / 200
华南冠纹柳莺 / 267
华南斑胸钩嘴鹛 / 275
池鹭 / 060
红头长尾山雀 / 257
红头咬鹃 / 181
红头穗鹛 / 274
红角鸮 / 172
红尾水鸲 / 330
红尾伯劳 / 220
红尾鸫 / 304
红尾歌鸲 / 317
红胁蓝尾鸲 / 319
红翅凤头鹃 / 164
红翅绿鸠 / 162
红翅鹃鹛 / 222
红隼 / 205
红胸田鸡 / 106
红胸秋沙鸭 / 027
红胸啄花鸟 / 340
红脚苦恶鸟 / 104
红脚隼 / 208
红脚鹬 / 145
红颈滨鹬 / 134
红颈瓣蹼鹬 / 140
红喉姬鹟 / 328
红喉歌鸲 / 318
红喉鹨 / 354
红嘴相思鸟 / 277
红嘴鸥 / 150
红嘴蓝鹊 / 230

七画

寿带 / 228
远东山雀 / 236
远东树莺 / 255
赤红山椒鸟 / 213
赤尾噪鹛 / 277
赤颈鸭 / 019
赤腹鹰 / 089
赤膀鸭 / 015
花脸鸭 / 015
苍鹭 / 066
苍鹰 / 093
极北柳莺 / 264
豆雁 / 006
丽星鹩鹛 / 287
矶鹬 / 141
针尾沙锥 / 138
针尾鸭 / 022
怀氏虎鸫 / 300
纯色山鹪莺 / 273

八画

环颈鸻 / 121
青脚滨鹬 / 132
青脚鹬 / 148
林雕 / 086
林鹬 / 147
松鸦 / 229
松雀鹰 / 091
画眉 / 278
虎纹伯劳 / 216
罗纹鸭 / 018
金色鸦雀 / 282
金翅雀 / 360
金眶鸻 / 120
金斑鸻 / 117
金腰燕 / 253
夜鹭 / 056
泽鹬 / 146

九画

草原雕 / 087
草鸮 / 170
草鹭 / 068
树鹨 / 352
厚嘴苇莺 / 269
鸥嘴噪鸥 / 155
星头啄木鸟 / 196
蚁䴕 / 195
骨顶鸡 / 103
钝翅苇莺 / 269
钩嘴林鹬 / 210
须浮鸥 / 157
冠纹柳莺 / 266
冠鱼狗 / 187
弯嘴滨鹬 / 131

十画

珠颈斑鸠 / 161
栗头鹟莺 / 264
栗耳鹀 / 369
栗苇鳽 / 053
栗背短脚鹎 / 240
栗啄木鸟 / 203
栗颈凤鹛 / 284
栗鹀 / 375
栗腹矶鸫 / 334
栗臀鸭 / 289
鸲姬鹟 / 326
鸳鸯 / 012
高山短翅莺 / 271
粉红胸鹨 / 355
烟腹毛脚燕 / 252
海南蓝仙鹟 / 311
海南鳽 / 055
流苏鹬 / 129
家燕 / 250
扇尾沙锥 / 138

十一画

理氏鹨 / 351
黄头鹡鸰 / 350
黄苇鳽 / 052
黄冠啄木鸟 / 200
黄眉林雀 / 235
黄眉柳莺 / 258
黄眉姬鹟 / 324
黄眉鹀 / 371
黄胸鹀 / 374
黄雀 / 364
黄脚三趾鹑 / 110
黄颊山雀 / 238
黄喉鹀 / 373
黄腰柳莺 / 258
黄腹山雀 / 237
黄腹山鹪莺 / 273
黄腹角雉 / 038
黄腹树莺 / 256
黄腹鹨 / 352
黄鹡鸰 / 346
黄嘴角鸮 / 172
黄嘴栗啄木鸟 / 202
雀鹰 / 092
冕柳莺 / 260
冕雀 / 235
蛇雕 / 083
铜蓝鹟 / 315
彩鹬 / 122
领角鸮 / 171
领雀嘴鹎 / 246
领鸺鹠 / 175
麻雀 / 343
淡色沙燕 / 248
淡尾鹟莺 / 262
淡眉雀鹛 / 276
淡脚柳莺 / 263
淡绿鳽鹛 / 223
绿头鸭 / 021
绿翅鸭 / 023
绿翅短脚鹎 / 241
绿鹭 / 058

十二画

琵嘴鸭 / 017
斑文鸟 / 344
斑头大翠鸟 / 186
斑头鸺鹠 / 176
斑尾鹃鸠 / 162
斑鱼狗 / 188
斑背潜鸭 / 026
斑背燕尾 / 321
斑鸫 / 307
斑姬啄木鸟 / 196
斑嘴鸭 / 020
喜鹊 / 232
董鸡 / 107
棉凫 / 014
棕三趾鹑 / 110
棕头鸦雀 / 282
棕尾褐鹟 / 310
棕背伯劳 / 218
棕扇尾莺 / 271
棕脸鹟莺 / 255
棕颈钩嘴鹛 / 275
棕腹大仙鹟 / 312
棕腹仙鹟 / 313
棕腹柳莺 / 260

棕褐短翅莺 / 270
棕噪鹛 / 281
紫翅椋鸟 / 297
紫啸鸫 / 322
黑叉尾海燕 / 044
黑水鸡 / 102
黑头鹀 / 370
黑头蜡嘴雀 / 360
黑尾鸥 / 154
黑尾塍鹬 / 128
黑尾蜡嘴雀 / 358
黑枕黄鹂 / 224
黑鸢 / 096
黑卷尾 / 227
黑冠鹃隼 / 082
黑眉苇莺 / 268
黑眉拟啄木鸟 / 194
黑眉柳莺 / 265
黑翅长脚鹬 / 111
黑翅鸢 / 080
黑领椋鸟 / 296
黑领噪鹛 / 280
黑脸噪鹛 / 280
黑喉山鹪莺 / 272
黑短脚鹬 / 242
黑颏凤鹛 / 285
黑腹滨鹬 / 135
黑鸦 / 054
黑鹳 / 048
短耳鸮 / 177
短尾鸦雀 / 283
短嘴豆雁 / 007
普通朱雀 / 362
普通夜鹰 / 178
普通鸬 / 288
普通秋沙鸭 / 028
普通鸬鹚 / 075
普通秧鸡 / 100
普通翠鸟 / 185
普通燕鸥 / 155
普通燕鸲 / 149
普通鵟 / 098
游隼 / 207
强脚树莺 / 256

十三画

鹊鸲 / 307
鹊鹞 / 095
蓝矶鸫 / 332
蓝胸秧鸡 / 101
蓝胸鹑 / 033
蓝鹀 / 366
蓝喉蜂虎 / 189
蓝喉歌鸲 / 318
蓝翡翠 / 184
楔尾伯劳 / 221
鹌鹑 / 032
暗灰鹃鸫 / 216
暗绿绣眼鸟 / 286
雉鸡 / 040
煤山雀 / 236

十四画

鹗 / 078
褐头雀鹛 / 281
褐灰雀 / 363
褐顶雀鹛 / 276
褐林鸮 / 174
褐河乌 / 337
褐柳莺 / 259
褐翅鸦鹃 / 163
褐胸鹟 / 309

十五画

鹤鹬 / 148

十六画

燕隼 / 206
燕雀 / 357
橙头地鸫 / 298
橙腹叶鹎 / 338
噪鹃 / 165
雕鸮 / 173

十七画

戴胜 / 192

十八画

鹰鹃 / 167
鹰雕 / 084

二十画

鳞头树莺 / 257

拉丁文索引

A

Abroscopus albogularis / 255
Accipiter gentilis / 093
Accipiter gularis / 090
Accipiter nisus / 092
Accipiter soloensis / 089
Accipiter trivirgatus / 088
Accipiter virgatus / 091
Acridotheres cristatellus / 290
Acrocephalus bistrigiceps / 268
Acrocephalus concinens / 269
Acrocephalus orientalis / 268
Actitis hypoleucos / 141
Aegithalos concinnus / 257
Aethopyga christinae / 341
Agropsar sturninus / 296
Aix galericulata / 012
Alauda gulgula / 240
Alcedo atthis / 185
Alcedo hercules / 186
Alcippe hueti / 276
Amaurornis phoenicurus / 108
Anas acuta / 022
Anas crecca / 023
Anas platyrhynchos / 021
Anas zonorhyncha / 020
Anser albifrons / 008
Anser fabalis / 006
Anser serrirostris / 007
Anthus cervinus / 354
Anthus gustavi / 353
Anthus hodgsoni / 352
Anthus richardi / 351
Anthus roseatus / 355
Anthus rubescens / 352
Anthus rufulus / 351
Anthus spinoletta / 356
Apus nipalensis / 180
Apus pacificus / 179
Aquila fasciata / 087
Aquila nipalensis / 087
Arborophila gingica / 034
Ardea alba / 070
Ardea cinerea / 066
Ardea intermedia / 069
Ardea purpurea / 068
Ardeola bacchus / 060
Artamus fuscus / 211
Arundinax aedon / 269
Asio flammeus / 177
Asio otus / 177
Aviceda leuphotes / 082
Aythya fuligula / 024
Aythya marila / 026

B

Bambusicola thoracicus / 035
Blythipicus pyrrhotis / 202
Brachypteryx leucophris / 316
Brachypteryx sinensis / 316
Bubo bubo / 173
Bubulcus coromandus / 064
Butastur indicus / 097
Buteo japonicus / 098
Butorides striata / 058

C

Cacomantis merulinus / 166
Calidris acuminata / 130
Calidris alpina / 135
Calidris ferruginea / 131
Calidris pugnax / 129
Calidris ruficollis / 134
Calidris subminuta / 133
Calidris temminckii / 132
Calliope calliope / 318
Caprimulgus jotaka / 178
Carpodacus erythrinus / 362
Cecropis daurica / 253
Centropus bengalensis / 163
Centropus sinensis / 163
Ceryle rudis / 188
Charadrius alexandrinus / 121
Charadrius dubius / 120
Charadrius placidus / 119
Chlidonias hybrida / 157
Chlidonias leucopterus / 158
Chloris sinica / 360
Chloropsis hardwickii / 338
Chroicocephalus ridibundus / 150
Chrysophlegma flavinucha / 199
Ciconia nigra / 048
Cinclus pallasii / 337
Circus cyaneus / 094
Circus melanoleucos / 095
Cisticola juncidis / 271
Clamator coromandus / 164
Clanga clanga / 085
Copsychus saularis / 307
Coracina macei / 215
Corvus macrorhynchos / 233
Corvus torquatus / 233
Coturnix japonica / 032
Cuculus canorus / 169
Cuculus micropterus / 168
Cuculus poliocephalus / 168
Cuculus saturatus / 169
Culicicapa ceylonensis / 234
Cyanoderma ruficeps / 274
Cyanoptila cyanomelana / 315
Cygnus columbianus / 009
Cyornis brunneatus / 310
Cyornis hainanus / 311

D

Delichon dasypus / 252
Dendrocitta formosae / 232
Dendrocopos leucotos / 198
Dendrocopos major / 197
Dendronanthus indicus / 346
Dicaeum ignipectus / 340
Dicrurus hottentottus / 225
Dicrurus leucophaeus / 226
Dicrurus macrocercus / 227

E

Egretta garzetta / 072
Elachura formosa / 287
Elanus caeruleus / 080

Emberiza aureola / 374
Emberiza chrysophrys / 371
Emberiza cioides / 367
Emberiza elegans / 373
Emberiza fucata / 369
Emberiza lathami / 365
Emberiza melanocephala / 370
Emberiza pusilla / 370
Emberiza rustica / 372
Emberiza rutila / 375
Emberiza siemsseni / 366
Emberiza spodocephala / 376
Emberiza tristrami / 368
Enicurus leschenaulti / 320
Enicurus maculatus / 321
Enicurus schistaceus / 320
Enicurus scouleri / 319
Eophona migratoria / 358
Eophona personata / 360
Erpornis zantholeuca / 221
Erythrogenys swinhoei / 275
Eudynamys scolopaceus / 165
Eumyias thalassinus / 315
Eurystomus orientalis / 182
Excalfactoria chinensis / 033

F
Falco amurensis / 208
Falco peregrinus / 207
Falco subbuteo / 206
Falco tinnunculus / 205
Ficedula albicilla / 328
Ficedula mugimaki / 326
Ficedula narcissina / 324
Ficedula zanthopygia / 323
Francolinus pintadeanus / 032
Fregata ariel / 074
Fringilla montifringilla / 357
Fulica atra / 103
Fulvetta manipurensis / 281

G
Gallicrex cinerea / 107
Gallinago gallinago / 138
Gallinago megala / 139
Gallinago stenura / 138
Gallinula chloropus / 102
Garrulax canorus / 278
Garrulax monileger / 278
Garrulus glandarius / 229
Gecinulus grantia / 200
Gelochelidon nilotica / 155
Geokichla citrina / 298
Geokichla sibirica / 299
Glareola maldivarum / 149
Glaucidium brodiei / 175
Glaucidium cuculoides / 176
Gorsachius magnificus / 055
Gracupica nigricollis / 296
Grus grus / 109

H
Halcyon pileata / 184
Halcyon smyrnensis / 183
Harpactes erythrocephalus / 181
Helopsaltes certhiola / 270
Hemixos castanonotus / 240
Hierococcyx sparverioides / 167
Himantopus himantopus / 111
Hirundapus caudacutus / 179
Hirundo rustica / 250
Horornis acanthizoides / 256
Horornis canturians / 255
Horornis fortipes / 256
Hydrophasianus chirurgus / 124
Hypsipetes leucocephalus / 242

I
Ianthocincla cineracea / 279
Ictinaetus malaiensis / 086
Ixobrychus cinnamomeus / 053
Ixobrychus flavicollis / 054
Ixobrychus sinensis / 052
Ixos mcclellandii / 241

J
Jynx torquilla / 195

L
Lalage melaschistos / 216
Lanius bucephalus / 218
Lanius cristatus / 220
Lanius schach / 218
Lanius sphenocercus / 221
Lanius tigrinus / 216
Larus crassirostris / 154
Larvivora akahige / 317
Larvivora sibilans / 317
Leiothrix lutea / 277
Lewinia striatia / 101
Limnodromus semipalmatus / 136
Limosa limosa / 128
Locustella luteoventris / 270
Locustella mandelli / 271
Lonchura punctulata / 344
Lonchura striata / 345
Lophura nycthemera / 037
Luscinia svecica / 318

M
Machlolophus spilonotus / 238
Macropygia unchall / 162
Mareca falcata / 018
Mareca penelope / 019
Mareca strepera / 015
Megaceryle lugubris / 187
Melanochlora sultanea / 235
Mergus merganser / 028
Mergus serrator / 027
Mergus squamatus / 030
Merops viridis / 189
Microhierax melanoleucos / 204
Micropternus brachyurus / 203
Milvus migrans / 096
Monticola rufiventris / 334
Monticola solitarius / 332
Motacilla alba / 348
Motacilla cinerea / 350
Motacilla citreola / 350
Motacilla tschutschensis / 346
Muscicapa dauurica / 309
Muscicapa ferruginea / 310
Muscicapa griseisticta / 308
Muscicapa muttui / 309
Muscicapa sibirica / 308
Myophonus caeruleus / 322

N
Neosuthora davidiana / 283
Nettapus coromandelianus / 014
Niltava davidi / 312
Niltava macgrigoriae / 314
Niltava sundara / 313
Ninox japonica / 174
Nisaetus nipalensis / 084
Numenius arquata / 127
Numenius phaeopus / 126
Nycticorax nycticorax / 056

O
Oceanodroma monorhis / 044
Oriolus chinensis / 224
Orthotomus sutorius / 274
Otus lettia / 171
Otus spilocephalus / 172
Otus sunia / 172

P
Pandion haliaetus / 078
Pardaliparus venustulus / 237
Parus minor / 236
Passer cinnamomeus / 342
Passer montanus / 343
Pericrocotus cantonensis / 214
Pericrocotus divaricatus / 211
Pericrocotus solaris / 212
Pericrocotus speciosus / 213
Periparus ater / 236
Pernis ptilorhynchus / 081
Phalacrocorax carbo / 075
Phalaropus lobatus / 140
Phasianus colchicus / 040
Phoenicurus auroreus / 329
Phoenicurus fuliginosus / 330
Phoenicurus leucocephalus / 331
Phylloscopus borealis / 264
Phylloscopus castaniceps / 264
Phylloscopus claudiae / 266
Phylloscopus coronatus / 260
Phylloscopus fuscatus / 259
Phylloscopus goodsoni / 267
Phylloscopus inornatus / 258
Phylloscopus intermedius / 261
Phylloscopus ogilviegranti / 267
Phylloscopus plumbeitarsus / 263
Phylloscopus proregulus / 258
Phylloscopus ricketti / 265
Phylloscopus schwarzi / 259
Phylloscopus soror / 262
Phylloscopus subaffinis / 260
Phylloscopus tenellipes / 263
Phylloscopus tephrocephalus / 261
Phylloscopus valentini / 262
Pica serica / 232
Picumnus innominatus / 196
Picus canus / 201
Picus chlorolophus / 200
Platalea leucorodia / 050
Pluvialis fulva / 117
Pluvialis squatarola / 118
Pnoepyga pusilla / 254
Podiceps cristatus / 045
Pomatorhinus ruficollis / 275
Prinia flaviventris / 273
Prinia inornata / 273
Prinia striata / 272
Prinia superciliaris / 272
Psilopogon faber / 194
Psilopogon virens / 193
Psittiparus gularis / 283
Pterorhinus berthemyi / 281
Pterorhinus pectoralis / 280
Pterorhinus perspicillatus / 280
Pterorhinus sannio / 279
Pteruthius aeralatus / 222
Pteruthius xanthochlorus / 223
Pucrasia macrolopha / 036
Pycnonotus aurigaster / 243
Pycnonotus sinensis / 244
Pyrrhula nipalensis / 363

R
Rallus indicus / 100
Recurvirostra avosetta / 112
Remiz consobrinus / 239
Riparia diluta / 248
Rostratula benghalensis / 122

S
Saxicola ferreus / 335
Saxicola stejnegeri / 336
Schoeniparus brunneus / 276
Scolopax rusticola / 137
Sibirionetta formosa / 015
Sinosuthora webbiana / 282
Sitta europaea / 288
Sitta nagaensis / 289
Spatula clypeata / 017
Spatula querquedula / 016
Spilopelia chinensis / 161
Spilornis cheela / 083
Spinus spinus / 364
Spizixos semitorques / 246
Spodiopsar cineraceus / 292
Spodiopsar sericeus / 293
Staphida torqueola / 284
Sterna hirundo / 155
Sternula albifrons / 156
Streptopelia orientalis / 159
Streptopelia tranquebarica / 160
Strix leptogrammica / 174
Sturnia sinensis / 297
Sturnus vulgaris / 297
Surniculus lugubris / 167
Suthora verreauxi / 282
Sylviparus modestus / 235
Syrmaticus ellioti / 042

T
Tachybaptus ruficollis / 046
Tarsiger cyanurus / 319
Tephrodornis virgatus / 210
Terpsiphone incei / 228
Tragopan caboti / 038
Treron sieboldii / 162
Tringa brevipes / 144
Tringa erythropus / 148
Tringa glareola / 147
Tringa nebularia / 148
Tringa ochropus / 142
Tringa stagnatilis / 146
Tringa totanus / 145
Trochalopteron milnei / 277
Turdus boulboul / 303

Turdus cardis / 302
Turdus eunomus / 307
Turdus hortulorum / 301
Turdus mandarinus / 304
Turdus naumanni / 304
Turdus obscurus / 305
Turdus pallidus / 306
Turnix suscitator / 110
Turnix tanki / 110
Tyto longimembris / 170

U

Upupa epops / 192
Urocissa erythroryncha / 230
Urosphena squameiceps / 257

V

Vanellus cinereus / 116
Vanellus vanellus / 114

Y

Yuhina nigrimenta / 285
Yungipicus canicapillus / 196

Z

Zapornia akool / 104
Zapornia fusca / 106
Zapornia pusilla / 105
Zoothera aurea / 300
Zosterops simplex / 286